

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE**Memac 5 mg compresse rivestite con film**

Donepezil cloridrato
Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia mai ad altri. Anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Memac compresse e a cosa serve
2. Prima di prendere Memac compresse
3. Come prendere Memac compresse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Memac compresse
6. Altre informazioni

1. CHE COS'È MEMAC COMPRESSE E A COSA SERVE

Memac compresse appartiene a un gruppo di medicinali chiamati inibitori dell'acetilcolinesterasi.

Viene impiegato per trattare i sintomi della demenza nei pazienti cui è stata diagnosticata una malattia di Alzheimer lieve o moderatamente grave. I sintomi includono perdita di memoria crescente, stato confusionale e alterazioni comportamentali. La conseguenza è che chi soffre della malattia di Alzheimer trova più difficile effettuare le attività quotidiane.

Memac compresse deve essere usato solo da pazienti adulti.

2. PRIMA DI PRENDERE MEMAC COMPRESSE**NON prenda Memac compresse**

- Se è allergico/a (ipersensibile) a donepezil cloridrato o ai derivati della piperidina, o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Memac compresse elencati nel paragrafo 6.

Faccia particolare attenzione con Memac compresse

Informi il medico o il farmacista prima di iniziare a prendere Memac compresse se ha oppure ha avuto:

- Ulcere gastriche o duodenali
- Crisi convulsive (parossismi) o convulsioni
- Un disturbo cardiaco (battito cardiaco irregolare o molto lento)
- Asma o altre malattie polmonari a lungo termine
- Problemi al fegato o epatite
- Difficoltà ad urinare o malattia renale lieve
- Sintomi extrapiramidali (tremori, rigidità o movimento incontrollato, soprattutto del viso e della lingua, ma anche degli arti). Memac compresse può indurre o aggravare i sintomi extrapiramidali.
- Memac compresse può essere utilizzato nei pazienti con malattia renale o con malattia epatica da lieve a moderata. Informi il medico se ha avuto malattie renali o epatiche. I pazienti con malattia epatica grave non devono prendere Memac compresse.

Informi inoltre il medico se è incinta o prevede di iniziare una gravidanza.

Assunzione di altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta prendendo o ha recentemente preso qualsiasi altro medicinale. Questi includono i medicinali non prescritti dal medico, ma acquistati di sua iniziativa da un chimico/farmacista. Questo vale anche per i medicinali che potrebbe assumere in futuro se continua a prendere Memac compresse. Questo perché questi medicinali possono indebolire o potenziare gli effetti di Memac compresse.

Informi il medico soprattutto se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Altri medicinali per la malattia di Alzheimer, ad es. galantamina
- Antidolorifici o medicinali per il trattamento dell'artrite, come ad esempio aspirina, o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene o diclofenac sodico
- Medicinali anticolinergici, ad es. tolterodina
- Antibiotici, ad es. eritromicina o rifampicina
- Medicinali antifungini, ad es. ketoconazolo
- Antidepressivi, ad es. fluoxetina
- Anticonvulsivi, ad es. fenitoina, carbamazepina
- Medicinali per trattare un disturbo cardiaco, ad es. chinidina, betabloccanti (propranololo e atenololo)
- Miorilassanti, ad es. diazepam, succinilcolina
- Anestetici generali

- Medicinali ottenuti senza prescrizione medica, ad es. prodotti di erboristeria.

Se sta per subire un'operazione in anestesia generale, informi il medico e l'anestesista che sta prendendo Memac compresse. Questo perché il medicinale può influenzare la quantità di anestetico necessaria.

Indichi al medico o al farmacista il nome della persona che la assiste. Questa persona l'aiuterà a prendere il medicinale come prescritto.

Assunzione di Memac compresse con cibi e bevande

Il cibo non influenza l'effetto di Memac compresse.

Memac compresse non deve essere assunto con bevande alcoliche perché l'alcol può alterarne l'effetto.

Gravidanza e allattamento

Non usi Memac compresse durante l'allattamento al seno.

Se è incinta o prevede di iniziare una gravidanza, chiedi consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

La malattia di Alzheimer può diminuire la sua abilità nella guida e nell'utilizzo di macchinari, non deve quindi svolgere tali attività a meno che il medico non le dica che può comunque svolgerle con un certo grado di sicurezza.

Inoltre, il medicinale può causare stanchezza, capogiri e crampi muscolari. Se si manifestano questi effetti, eviti di guidare e non utilizzi macchinari.

Informazioni importanti sugli eccipienti di Memac compresse

Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti prima di prendere Memac compresse.

3. COME PRENDERE MEMAC COMPRESSE

Quanto Memac compresse deve prendere?

Dosaggio

Di solito, inizi a prendere 5 mg (una compressa bianca) ogni sera. Dopo un mese, il medico le dirà di prendere 10 mg (una compressa gialla) ogni sera.

Deglutisca Memac con un sorso d'acqua la sera prima di andare a letto.

Il dosaggio delle compresse che dovrà prendere può cambiare a seconda di quando ha iniziato ad assumere il medicinale ed in base alle raccomandazioni del medico. La dose massima raccomandata è di 10 mg ogni sera.

Segua sempre le istruzioni del medico o del farmacista su come e quando assumere il medicinale.

Non modifichi la dose senza aver consultato il medico.

Per quanto tempo deve prendere Memac compresse?

Il medico o il farmacista le consiglieranno per quanto tempo continuare a prendere le compresse. Dovrà tornare periodicamente dal medico per rivedere il trattamento e valutare i sintomi.

Se smette di prendere Memac compresse

Non smetta di prendere le compresse, a meno che non sia il medico a dirle di farlo. Se smette di prendere Memac compresse, i benefici del trattamento spariranno gradualmente.

Se prende più Memac compresse di quanto deve

NON prenda più di una compressa al giorno. Se ne prende più di quanto deve, contatti immediatamente il medico. Se non può mettersi in contatto con il medico si rechi immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Porti sempre con sé in ospedale le compresse e l'astuccio di cartone, in modo che il medico sappia quale prodotto ha preso.

I sintomi del sovradosaggio includono nausea e vomito, eccessiva sudorazione, sudorazione, frequenza cardiaca rallentata, pressione arteriosa bassa (leggero intontimento o capogiri stando in piedi), problemi di respirazione, perdita di coscienza e crisi convulsive (parossismi) o convulsioni.

Se dimentica di prendere Memac compresse

Se dimentica di prendere una compressa, si limiti a prendere una compressa il giorno seguente alla solita ora. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se dimentica di prendere il medicinale per più di una settimana, chiami il medico prima di prendere altro medicinale.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Memac compresse può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questi sono gli effetti indesiderati riportati da pazienti che hanno preso Memac compresse.

Informi il medico se presenta uno di questi effetti mentre sta prendendo Memac compresse.

Effetti indesiderati gravi:

Informi immediatamente il medico se osserva questi effetti indesiderati gravi menzionati. È possibile che abbia bisogno di un trattamento clinico d'urgenza.

- Danno epatico, ad es. epatite. I sintomi dell'epatite sono nausea e vomito, perdita dell'appetito, sensazione di malessere generale, febbre, prurito, ingiallimento di cute e occhi, urina di colore scuro (interessano 1-10 utilizzatori su 10.000).
- Ulcere gastriche e duodenali. I sintomi delle ulcere sono dolore e fastidio allo stomaco (indigestione) percepiti tra l'ombelico e lo sterno (interessano 1-10 utilizzatori su 1.000).
- Sanguinamento a livello di stomaco e intestino. Questo può causare l'emissione di feci di colore nero come il carbone o di sangue evidente dal retto (interessa 1-10 utilizzatori su 1.000).
- Crisi convulsive (parossismi) o convulsioni (interessano 1-10 utilizzatori su 1.000).
- Febbre con rigidità muscolare, sudorazione e una diminuzione del livello di coscienza (un disordine chiamato "Sindrome Neurolettica Maligna").
- Debolezza muscolare, sensibilità o dolore e in particolare, se si è anche in uno stato di malessere, si può arrivare a febbre alta o avere urine scure. Questi sintomi possono essere causati da una anormale distruzione del tessuto muscolare che può essere pericolosa per la vita e portare a problemi renali (una condizione chiamata rabdomiolisi).

Effetti indesiderati molto comuni (interessano più di 1 utilizzatore su 10):

- Diarrea
- Nausea o vomito
- Cefalea

Effetti indesiderati comuni (interessano 1-10 utilizzatori su 100):

- Crampi muscolari
- Stanchezza
- Difficoltà a prendere sonno (insonnia)
- Sintomi di tipo influenzale
- Perdita dell'appetito
- Allucinazioni (percezione visiva o uditiva di cose inesistenti)
- Agitazione
- Comportamento aggressivo
- Svenimento
- Capogiri
- Fastidio allo stomaco
- Rash
- Prurito
- Minzione incontrollata
- Dolore
- Incidenti (i pazienti possono tendere a cadere e procurarsi lesioni accidentali)
- Sogni inusuali inclusi incubi

Effetti indesiderati non comuni (interessano 1-10 utilizzatori su 1.000):

- Battito cardiaco rallentato

Effetti indesiderati rari (interessano 1-10 utilizzatori su 10.000):

- Rigidità, tremori o movimento incontrollato, soprattutto del viso e della lingua, ma anche degli arti

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE MEMAC COMPRESSE

Non conservare a temperatura superiore ai 30C. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

NON usi Memac compresse dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Se il medico le chiede di interrompere l'assunzione del medicinale, restituisca al farmacista le compresse eventualmente inutilizzate.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Memac compresse?

Il principio attivo è donepezil cloridrato. La compressa da 5 mg contiene 5 mg di donepezil cloridrato.

Gli eccipienti sono

Nucleo: lattosio monoidrato, biossido di silicio colloidale, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato e magnesio stearato.

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b), glicole propilenico (E1520) e biossido di titanio (E171).

Quale aspetto ha Memac compresse?

Compresse da 5 mg: compresse rivestite gastroresistenti, biconvesse, rotonde, di colore bianco-biancastro, con impresso "ML 89" su un lato e piane dall'altra.

Cosa c'è in una confezione di Memac compresse?

Le compresse sono fornite in confezioni da 28 unità.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bracco s.p.a. Via E. Folli, 50 - Milano

Produttore

Bracco s.p.a.

Via Caduti di Marcinelle, 13

20134 Milano Italy

o

Mawdsleys Brooks and Co Ltd

Unit 22, Quest Park,

Wheatley Hall Road,

Doncaster,

DN2 4LT, Regno Unito

Questo prodotto medicinale è autorizzato negli Stati Membri della EEA con i seguenti nomi commerciali

Regno Unito	Donepezil Hydrochloride 5mg Film-coated tablet
Germania	Donepezil hydrochlorid Macleods 5mg Film tabletten
Italia	Memac 5mg compresse rivestite con film
Spagna	Donepezil Macleods 5mg comprimidos recubiertos con película

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Memac 10 mg compresse rivestite con film

Donepezil cloridrato
Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- e ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia mai ad altri. Anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Memac compresse e a cosa serve
2. Prima di prendere Memac compresse
3. Come prendere Memac compresse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Memac compresse
6. Altre informazioni

1. CHE COS'È MEMAC COMPRESSE E A COSA SERVE

Memac compresse appartiene a un gruppo di medicinali chiamati inibitori dell'acetilcolinesterasi.

Viene impiegato per trattare i sintomi della demenza nei pazienti cui è stata diagnosticata una malattia di Alzheimer lieve o moderatamente grave. I sintomi includono perdita di memoria crescente, stato confusionale e alterazioni comportamentali. La conseguenza è che chi soffre della malattia di Alzheimer trova più difficile effettuare le attività quotidiane.

Memac compresse deve essere usato solo da pazienti adulti.

2. PRIMA DI PRENDERE MEMAC COMPRESSE

NON prenda Memac compresse

- Se è allergico/a (ipersensibile) a donepezil cloridrato o ai derivati della piperidina, o uno qualsiasi degli eccipienti di Memac compresse elencati nel paragrafo 6.

Faccia particolare attenzione con Memac compresse

Informi il medico o il farmacista prima di iniziare a prendere Memac compresse se ha oppure ha avuto:

- Ulcere gastriche o duodenali
- Crisi convulsive (parossismi) o convulsioni
- Un disturbo cardiaca (battito cardiaco irregolare o molto lento)
- Asma o altre malattie polmonari a lungo termine
- Problemi al fegato o epatite
- Difficoltà ad urinare o malattia renale lieve
- Sintomi extrapiramidali (tremori, rigidità o movimento incontrollato, soprattutto del viso e della lingua, ma anche degli arti). Memac compresse può indurre o aggravare i sintomi extrapiramidali.
- Memac compresse può essere utilizzato nei pazienti con malattia renale o con malattia epatica da lieve a moderata. Informi il medico se ha avuto malattie renali o epatiche. I pazienti con malattia epatica grave non devono prendere Memac compresse.

Informi inoltre il medico se è incinta o prevede di iniziare una gravidanza.

Assunzione di altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta prendendo o ha recentemente preso qualsiasi altro medicinale. Questi includono i medicinali non prescritti dal medico, ma acquistati di sua iniziativa da un chimico/farmacista. Questo vale anche per i medicinali che potrebbe assumere in futuro se continua a prendere Memac compresse. Questo perché questi medicinali possono indebolire o potenziare gli effetti di Memac compresse.

Informi il medico soprattutto se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti tipi di medicinali:

- Altri medicinali per la malattia di Alzheimer, ad es. galantamina

- Antidolorifici o medicinali per il trattamento dell'artrite, come ad esempio aspirina, o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene o diclofenac sodico
- Medicinali anticolinergici, ad es. tolterodina
- Antibiotici, ad es. eritromicina o rifampicina
- Medicinali antifungini, ad es. ketoconazolo
- Antidepressivi, ad es. fluoxetina
- Anticonvulsivi, ad es. fenitoina, carbamazepina
- Medicinali per trattare un disturbo cardiaco, ad es. chinidina, betabloccanti (propranololo e atenololo)
- Miorilassanti, ad es. diazepam, succinilcolina
- Anestetici generali
- Medicinali ottenuti senza prescrizione medica, ad es. prodotti di erboristeria.

Se sta per subire un'operazione in anestesia generale, informi il medico e l'anestesista che sta prendendo Memac compresse. Questo perché il medicinale può influenzare la quantità di anestetico necessaria.

Indichi al medico o al farmacista il nome della persona che la assiste. Questa persona l'aiuterà a prendere il medicinale come prescritto.

Assunzione di Memac compresse con cibi e bevande

Il cibo non influenza l'effetto di Memac compresse.

Memac compresse non deve essere assunto con bevande alcoliche perché l'alcol può alterarne l'effetto.

Gravidanza e allattamento

Non usi Memac compresse durante l'allattamento al seno.

Se è incinta o prevede di iniziare una gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

La malattia di Alzheimer può diminuire la sua abilità nella guida e nell'utilizzo di macchinari, non deve quindi svolgere tali attività a meno che il medico non le dica che può comunque svolgerle con un certo grado di sicurezza.

Inoltre, il medicinale può causare stanchezza, capogiri e crampi muscolari. Se si manifestano questi effetti, eviti di guidare e non utilizzi macchinari.

Informazione importante sugli eccipienti di Memac compresse

Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Memac compresse.

3. COME PRENDERE MEMAC COMPRESSE

Quanto Memac compresse deve prendere?

Dosaggio

Di solito, inizi a prendere 5 mg (una compressa bianca) ogni sera. Dopo un mese, il medico le dirà di prendere 10 mg (una compressa gialla) ogni sera.

Deglutisca Memac con un sorso d'acqua la sera prima di andare a letto.

Il dosaggio delle compresse che dovrà prendere può cambiare a seconda di quando ha iniziato ad assumere il medicinale ed in base alle raccomandazioni del medico. La dose massima raccomandata è di 10 mg ogni sera.

Segua sempre le istruzioni del medico o del farmacista su come e quando assumere il medicinale.

Non modifichi la dose senza aver consultato il medico.

Per quanto tempo deve prendere Memac compresse?

Il medico o il farmacista le consiglieranno per quanto tempo continuare a prendere le compresse. Dovrà tornare periodicamente dal medico per rivedere il trattamento e valutare i sintomi.

Se smette di prendere Memac compresse

Non smetta di prendere le compresse, a meno che non sia il medico a dirle di farlo. Se smette di prendere Memac compresse, i benefici del trattamento spariranno gradualmente.

Se prende più Memac compresse di quanto deve

NON prenda più di una compressa al giorno. Se ne prende più di quanto deve contatti immediatamente il medico. Se non può mettersi in contatto con il medico si rechi immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Porti sempre con sé in ospedale le compresse e l'astuccio di cartone, in modo che il medico sappia quale prodotto ha preso.

I sintomi del sovradosaggio includono nausea e vomito, eccessiva sudorazione, sudorazione, frequenza cardiaca rallentata, pressione

arteriosa bassa (leggero intontimento o capogiri stando in piedi), problemi di respirazione, perdita di coscienza e crisi convulsive (parossismi) o convulsioni.

Se dimentica di prendere Memac compresse

Se dimentica di prendere una compressa, si limiti a prendere una compressa il giorno seguente alla solita ora. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se dimentica di prendere il medicinale per più di una settimana, chiami il medico prima di prendere altro medicinale.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Memac compresse può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questi sono gli effetti indesiderati riportati da pazienti che hanno preso Memac compresse.

Informi il medico se presenta uno di questi effetti mentre sta prendendo Memac compresse.

Effetti indesiderati gravi:

Informi immediatamente il medico se osserva questi effetti indesiderati gravi menzionati. È possibile che abbia bisogno di un trattamento clinico d'urgenza.

- Danno epatico, ad es. epatite. I sintomi dell'epatite sono nausea e vomito, perdita dell'appetito, febbre, prurito, ingiallimento di cute e occhi, urina di colore scuro (interessano 1-10 utilizzatori su 10 000).
- Ulcere gastriche e duodenali. I sintomi delle ulcere sono dolore e fastidio allo stomaco (indigestione) percepiti tra l'ombelico e lo sterno (interessano 1-10 utilizzatori su 1000).
- Sanguinamento a livello di stomaco e intestino. Questo può causare l'emissione di feci di colore nero come il carbone o di sangue evidente dal retto (interessa 1-10 utilizzatori su 1000).
- Crisi convulsive (parossismi) o convulsioni (interessano 1-10 utilizzatori su 1000).
- Febbre con rigidità muscolare, sudorazione, e una diminuzione del livello di coscienza (un disordine chiamato "Sindrome Neurolettica Maligna").

- Debolezza muscolare, sensibilità o dolore e in particolare, se si è anche in uno stato di malessere, si può arrivare a febbre alta o avere urine scure. Questi sintomi possono essere causati da una anormale distruzione del tessuto muscolare che può essere pericolosa per la vita e portare a problemi renali (una condizione chiamata rabdomiolisi) .

Effetti indesiderati molto comuni (interessano più di 1 utilizzatore su 10):

- Diarrea
- Nausea o vomito
- Cefalea

Effetti indesiderati comuni (interessano 1-10 utilizzatori su 100):

- Crampi muscolari
- Stanchezza
- Difficoltà a prendere sonno (insonnia)
- Sintomi di tipo influenzale
- Perdita dell'appetito
- Allucinazioni (percezione visiva o uditiva di cose inesistenti)
- Agitazione
- Comportamento aggressivo
- Svenimento
- Capogiri
- Fastidio allo stomaco
- Rash
- Prurito
- Minzione incontrollata
- Dolore
- Incidenti (i pazienti possono tendere a cadere e procurarsi lesioni accidentali)
- Sogni inusuali inclusi incubi

Effetti indesiderati non comuni (interessano 1-10 utilizzatori su 1000):

- Battito cardiaco rallentato

Effetti indesiderati rari (interessano 1-10 utilizzatori su 10 000):

- Rigidità, tremori o movimento incontrollato, soprattutto del viso e della lingua, ma anche degli arti

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE MEMAC COMPRESSE

Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

NON usi Memac compresse dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Se il medico le chiede di interrompere l'assunzione del medicinale, restituisca al farmacista le compresse eventualmente inutilizzate.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Memac compresse?

Il principio attivo è donepezil cloridrato. La compressa da 10 mg contiene 10 mg di donepezil cloridrato

Gli eccipienti sono

Nucleo: lattosio monoidrato, biossido di silicio colloidale, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato e magnesio stearato.

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b), glicole propilenico (E1520), biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo sintetico (E172).

Quale aspetto ha Memac compresse?

Compresse da 10 mg: compresse rivestite gastroresistenti, biconvesse, rotonde, di colore giallo, con impresso "ML 88" su un solo lato.

Cosa c'è in una confezione di Memac compresse?

Le compresse sono fornite in confezioni da 28 unità.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bracco s.p.a. Via E. Folli, 50 - Milano

Produttore

Bracco s.p.a.
Via Caduti di Marcinelle, 13
20134 Milano Italy

Mawdsleys Brooks and Co Ltd
Unit 22, Quest Park,
Wheatley Hall Road,
Doncaster,
DN2 4LT, Regno Unito.

Questo prodotto medicinale è autorizzato negli Stati Membri della EEA con i seguenti nomi commerciali

Regno Unito	Donepezil hydrochloride 10mg Film-coated tablet
Germania	Donepezil hydrochlorid Macleods 10mg Film tabletten
Italia	Memac 10mg compresse rivestite con film
Spagna	Donepezil Macleods 10mg comprimidos recubiertos con película

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il

Agenzia Italiana del Farmaco