

STREPTOMAGMA® Sospensione

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO : *STREPTOMAGMA Sospensione*

COMPOSIZIONE

100 ml contengono : **Principi attivi:** gel d'idrossido di alluminio con g 0,954 di Al_2O_3 ; caolino g 10,000; pectina g 0,900. **Eccipienti:** olio di vaselina, glicerina, sodio benzoato, acido benzoico, saccarina, vanillina, metilparaben, propilparaben, butilparaben, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua q.b.

COME SI PRESENTA

Streptomagma si presenta in forma di sospensione, in flacone da 90 ml

CHE COSA E'

Streptomagma è un prodotto antidiarroico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:

PfizerItalia S.r.L. - Divisione Consumer Healthcare, Via Isonzo n. 71 - 04100 LATINA

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

FAMAR S.A. 190 11 Avlon, Attiki – Grecia

PERCHE' SI USA

Streptomagma si usa nel trattamento sintomatico delle diarree di natura non specifica.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto. Insufficienza renale. Ipofofosfatemia.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Non esistono controindicazioni se il prodotto è correttamente usato.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Si tenga presente che il prodotto, per la presenza di alluminio, può interferire con la somministrazione orale di altri farmaci, in particolare deve essere evitata la somministrazione contemporanea di tetracicline che può dar luogo a complessi insolubili con riduzione dell'assorbimento e dell'attività di tali antibiotici.

E' comunque opportuno non somministrare altri farmaci per via orale entro 1 o 2 ore dall'impiego del prodotto.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili e nei casi di diarrea accompagnata da febbre alta, sangue nelle feci, consultare il medico.

Nei bambini di età inferiore ai 3 anni Streptomagma sospensione deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto, come e per quanto tempo

Adulti: 4 cucchiaini da tè (3 volte al giorno) prima dei pasti.

Bambini oltre i 3 anni : secondo il peso, 1-2 cucchiaini da tè (3 volte al giorno) prima dei pasti.

Bambini di età inferiore ai 3 anni: secondo parere Medico.

Tenere il flacone ben chiuso. Agitare prima dell'uso.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del Medico.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Streptomagma sospensione avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti particolari effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, nella sua confezione originale.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:

30 Ottobre 2012