

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Combantrin 250 mg/5 ml sospensione orale

Pirantel Pamoato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei o per il suo bambino. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Combantrin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Combantrin
3. Come prendere Combantrin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Combantrin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Combantrin e a cosa serve

Combantrin contiene il principio attivo pirantel (come pirantel pamoato).

Il pirantel pamoato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antelmintici e antinematodi che sono utilizzati per uccidere diversi tipi di vermi o elminti che si trovano nell'intestino, facilitandone l'eliminazione.

Combantrin è indicato per il trattamento di infestazioni da parassiti noti come ossiuri (*Enterobius vermicularis*) e ascaridi (*Ascaris lumbricoides*).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Combantrin

Non prenda Combantrin

- se è allergico al pirantel pamoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Combantrin se:

- ha **gravi problemi al fegato**, in quanto si sono verificate alterazioni dei risultati di alcune analisi del sangue che indicano la funzionalità del fegato (SGOT).
- un membro della sua famiglia o di una comunità di persone con cui lei è a contatto ha sviluppato un'**infestazione da parassiti**. In questi casi il medico le consiglierà di iniziare un trattamento preventivo con Combantrin e di rispettare le più rigorose norme igieniche.

Questo medicinale non colora la mucosa della bocca e non altera il colore delle feci.

Bambini

Combantrin è sconsigliato nei bambini di età inferiore ad 1 anno a causa della mancanza di dati sulla sicurezza di questo medicinale.

Altri medicinali e Combantrin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico se sta assumendo **piperazina**, un altro medicinale usato per il trattamento delle infestazioni da parassiti, perché l'efficacia di Combantrin potrebbe diminuire o essere annullata.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Se è o sospetta di essere in gravidanza, prenda questo medicinale solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Allattamento

Se sta allattando al seno, si rivolga al medico che valuterà se interrompere l'allattamento o il trattamento con Combantrin.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Se si manifesta un effetto indesiderato che può alterare queste capacità, eviti di guidare o di utilizzare macchinari.

Combantrin 250 mg/5 ml sospensione orale contiene sorbitolo

Questo medicinale contiene sorbitolo, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Combantrin

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Combantrin deve essere assunto per bocca, in un'unica somministrazione al giorno. La sospensione orale deve essere agitata bene prima dell'uso.

Può assumere questo medicinale indipendentemente dai pasti.

Prima e durante la terapia non è necessario utilizzare un purgante, per facilitare l'eliminazione delle feci.

Il medico le indicherà la dose totale di medicinale da prendere in base al peso corporeo, considerando che la dose raccomandata è di 10 mg per kg di peso corporeo.

• Combantrin 50 mg/ml sospensione orale

- peso inferiore a 12 kg: mezzo cucchiaino al giorno;
- da 12 a 22 kg: mezzo-1 cucchiaino al giorno;
- da 22 a 41 kg: 1-2 cucchiaini al giorno;
- da 41 a 75 kg: 2-3 cucchiaini al giorno.

Se prende più Combantrin di quanto deve

Se lei ritiene di avere preso più Combantrin del necessario, informi immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Combantrin

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Prenda soltanto la dose successiva, al solito orario.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati che si osservano più frequentemente sono correlati con l'apparato gastrointestinale.

Si rivolga al medico se lei manifesta i seguenti effetti indesiderati:

- nausea, vomito, dolore allo stomaco, crampi all'addome, diarrea, stimolo costante e spesso doloroso di urinare o defecare;
- alterazioni dei risultati di alcune analisi del sangue per il funzionamento del fegato (elevazione della SGOT);
- perdita di appetito;
- mal di testa, vertigini, sonnolenza;
- incapacità a prendere sonno;
- sudori freddi, sudore, prurito, irritazione della pelle, orticaria.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Combantrin

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sul blister o sul flacone dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Combantrin

Il principio attivo è pirantel (come pirantel pamoato).

Combantrin 250mg/5ml sospensione orale

100 ml di sospensione orale contengono 14.400 mg di pirantel pamoato (pari a 5.000 mg di pirantel base).

Gli altri componenti sono: emulsione di siliconi, acido citrico, povidone, lecitina, sodio benzoato (E211), **sorbitolo** soluzione (vedere paragrafo "Combantrin 250 mg/5 ml sospensione orale contiene sorbitolo"), glicerina, silicato di alluminio e magnesio, polisorbato 80, aroma di ribes, aroma di crema di caramello, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Combantrin e contenuto della confezione

Combantrin 250mg/5ml sospensione orale

Flacone di vetro da 30 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Pfizer Italia S.r.l.

Via Isonzo, 71
04100 Latina

Produttore

Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S.156, Km 47,600 Borgo San Michele
04100 Latina

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco