

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Ciprofloxacina Pfizer 250 mg compresse rivestite con film
Ciprofloxacina Pfizer 500 mg compresse rivestite con film
Ciprofloxacina Pfizer 750 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Ciprofloxacina Pfizer e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ciprofloxacina Pfizer
3. Come prendere Ciprofloxacina Pfizer
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ciprofloxacina Pfizer
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Ciprofloxacina Pfizer e a cosa serve

Ciprofloxacina Pfizer è un antibiotico della famiglia dei fluorochinoloni. Il principio attivo è la ciprofloxacina. La ciprofloxacina agisce uccidendo i batteri causa di infezioni. Essa è in grado di agire solamente su specifici ceppi di batteri.

Adulti

Ciprofloxacina Pfizer è utilizzata nei soggetti adulti per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche:

- infezioni del tratto respiratorio
- infezioni dell'orecchio e del naso di lunga durata o ricorrenti
- infezioni del tratto urinario
- infezioni dei testicoli
- infezioni degli organi genitali nelle donne
- infezioni del tratto gastro-intestinale e infezioni intra-addominali
- infezioni della cute e dei tessuti molli
- infezioni delle ossa e delle articolazioni
- per il trattamento delle infezioni in pazienti con una conta dei globuli bianchi molto bassa (neutropenia)
- per la prevenzione di infezioni in pazienti con una conta dei globuli bianchi molto bassa (neutropenia)
- per la prevenzione di infezioni dovute al batterio *Neisseria meningitidis*
- esposizione all'antrace per via inalatoria

Se ha un'infezione grave o un'infezione causata da più di un tipo di batterio, le potrà essere dato un trattamento antibiotico aggiuntivo oltre a Ciprofloxacina Pfizer.

Bambini e adolescenti

Ciprofloxacina Pfizer viene utilizzata in bambini e adolescenti, sotto la supervisione del medico specialista, per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche:

- infezioni dei polmoni e dei bronchi in bambini e adolescenti che soffrono di fibrosi cistica
- infezioni complicate del tratto urinario, incluse quelle che hanno raggiunto i reni (pielonefriti)
- esposizione all'antrace per via inalatoria

Ciprofloxacina Pfizer può essere utilizzata anche per il trattamento di altre infezioni gravi specifiche in bambini e adolescenti, qualora il medico lo consideri necessario.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Ciprofloxacina Pfizer

Non prenda Ciprofloxacina Pfizer:

- se è allergico alla ciprofloxacina, ad altri farmaci chinolonici o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se sta assumendo tizanidina (vedere paragrafo 2: Altri medicinali e Ciprofloxacina Pfizer).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, all'infermiere o al farmacista prima di prendere Ciprofloxacina Pfizer se lei:

- ha problemi cardiaci. Si deve prestare attenzione quando si usa questo tipo di medicinale, se è nato con o ha una storia familiare di intervallo QT prolungato (visualizzato all'ECG, una registrazione elettrica del cuore), ha uno squilibrio salino nel sangue (specialmente un basso livello di potassio o magnesio nel sangue), ha un ritmo del cuore molto lento (chiamato bradicardia), ha un cuore debole (insufficienza cardiaca), ha una storia di attacco di cuore (infarto del miocardio), se è una donna o un paziente anziano o se sta assumendo altri medicinali che possono provocare cambiamenti anormali all'ECG (vedere paragrafo Altri medicinali e Ciprofloxacina Pfizer)
- ha già avuto problemi renali perchè potrebbe essere necessario un aggiustamento del trattamento
- soffre di epilessia o altre condizioni neurologiche
- in passato, ha avuto problemi ai tendini durante precedenti trattamenti con antibiotici come Ciprofloxacina Pfizer
- soffre di miastenia grave (un tipo di debolezza muscolare)

Durante il trattamento con Ciprofloxacina Pfizer

Informi immediatamente il medico, se **durante il trattamento con Ciprofloxacina Pfizer** dovesse accadere quanto segue. Il medico deciderà se interrompere il trattamento con Ciprofloxacina Pfizer.

- **Improvvisa reazione allergica grave** (una reazione/shock anafilattica/o, angioedema). Già alla prima dose, si ha una bassa possibilità di manifestare una reazione allergica grave con i seguenti sintomi: senso di oppressione al petto, stordimento, malessere o svenimento, o capogiro quando ci si alza in piedi. **Se questo accade, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e contatti immediatamente il medico.**
- **Dolore e gonfiore delle articolazioni e tendiniti** possono presentarsi occasionalmente, soprattutto se è anziano ed è in trattamento anche con corticosteroidi. Ai primi segni di dolore o infiammazione, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e lasci a riposo la parte interessata. Eviti ogni sforzo non necessario, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di rottura del tendine. Infiammazione e rotture dei tendini possono verificarsi anche fino a diversi mesi dopo l'interruzione del trattamento con Ciprofloxacina Pfizer.
- Se soffre di **epilessia** o altre **condizioni neurologiche** come ischemia o ictus cerebrale, può manifestare effetti indesiderati associati al sistema nervoso centrale. Se ciò accade, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e contatti immediatamente il medico.
- Può manifestare **reazioni psichiatriche** la prima volta che prende Ciprofloxacina Pfizer. Se soffre di **depressione** o **psicosi**, i suoi sintomi possono peggiorare durante il trattamento con Ciprofloxacina Pfizer. Se ciò accade, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e contatti immediatamente il medico.

- Può manifestare sintomi di neuropatia come dolore, bruciore, formicolio, intorpidimento e/o debolezza. Se ciò accade, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e contatti immediatamente il medico.
- Può avere **diarrea** durante il trattamento con antibiotici, inclusa Ciprofloxacina Pfizer, o anche diverse settimane dopo aver terminato il trattamento. Se questa diventa grave o persistente, o se nota che le sue feci contengono sangue o muco, smetta immediatamente di prendere Ciprofloxacina Pfizer perché può essere pericoloso per la sua vita. Non prenda medicinali che blocchino o rallentino i movimenti intestinali e contatti il medico.
- Se deve fornire **campioni di sangue o urina**, informi il medico o il personale di laboratorio che sta prendendo Ciprofloxacina Pfizer.
- Ciprofloxacina Pfizer può causare **danno al fegato**. Se nota sintomi quali perdita di appetito, ittero (colorazione gialla della pelle), urina scura, prurito, o dolore di stomaco, smetta di prendere Ciprofloxacina Pfizer e contatti immediatamente il medico.
- Ciprofloxacina Pfizer può causare una riduzione del numero di globuli bianchi e la sua **resistenza alle infezioni può essere ridotta**. Se ha un'infezione con sintomi quali febbre e serio peggioramento delle sue condizioni generali, o febbre con sintomi di infezione locale come ulcerazioni a gola/faringe/bocca o problemi urinari, deve recarsi immediatamente dal medico. Dovrà essere effettuato un esame del sangue per controllare l'eventuale riduzione dei globuli bianchi (agranulocitosi). E' importante che lei informi il medico sul medicinale che sta prendendo.
- Informi il medico se lei o uno dei suoi familiari soffrono di deficienza della glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), perché rischia di manifestare anemia se assume la ciprofloxacina.
- La sua pelle diventa **più sensibile alla luce solare o ai raggi ultravioletti (UV)** se prende Ciprofloxacina Pfizer. Eviti l'esposizione alla luce solare forte, o alla luce UV artificiale come quella dei lettini solari.

Altri medicinali e Ciprofloxacina Pfizer

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non prenda Ciprofloxacina Pfizer insieme a tizanidina, perché ciò può causare effetti indesiderati come bassa pressione sanguigna e sonnolenza (vedere paragrafo 2: Non prenda Ciprofloxacina Pfizer).

Deve informare il medico se sta assumendo altri medicinali che possono alterare il ritmo cardiaco: i medicinali che appartengono alla classe degli antiaritmici (es. chinidina, idrochinidina, disopiramide, amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibutilide), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (che appartengono al gruppo dei macrolidi), alcuni antipsicotici.

E' noto che i seguenti medicinali interagiscono con la Ciprofloxacina Pfizer nel suo organismo. L'assunzione di Ciprofloxacina Pfizer insieme a questi medicinali può influenzare il loro effetto terapeutico. Inoltre, ciò può aumentare la possibilità di manifestare effetti indesiderati.

Informi il medico se sta assumendo:

- warfarin, acenocumarolo, fenprocumone, fluidione o altri anticoagulanti orali (per sciogliere il sangue)
- probenecid (per la gotta)
- metoclopramide (per nausea ed emicrania)
- omeprazolo (per ulcere dello stomaco, indigestione, bruciore di stomaco e sindrome di Zollinger-Ellison)
- ciclosporina (un immunosoppressore)
- metotrexato (per alcuni tipi di cancro, psoriasi, artrite reumatoide)
- teofillina (per problemi respiratori)
- tizanidina (per la spasticità muscolare nella sclerosi multipla)
- clozapina (un antipsicotico)
- ropinirolo (per il morbo di Parkinson)

- fenitoina (per l'epilessia)
- olanzapina (un antipsicotico)
- glibenclamide (per il diabete)

Ciprofloxacina Pfizer può **umentare** i livelli dei seguenti medicinali nel suo sangue:

- pentossifillina (per i disturbi circolatori)
- caffeina
- lidocaina (un anestetico)
- sildenafil (per la disfunzione erettile)
- duloxetina (per depressione, ansia, dolore e incontinenza da stress)

Alcuni medicinali **riducono** l'effetto di Ciprofloxacina Pfizer. Informi il medico se sta prendendo o intende prendere:

- antiacidi
- integratori minerali
- sucralfato
- un legante fosfato polimerico (es. sevelamer)
- medicinali o integratori contenenti calcio, magnesio, alluminio o ferro

Se tali preparazioni sono essenziali, prenda Ciprofloxacina Pfizer almeno due ore prima e almeno 4 ore dopo di esse.

Ciprofloxacina Pfizer con cibi e bevande

Se non assume Ciprofloxacina Pfizer durante i pasti, non mangi o beva alcun derivato del latte (come latte o yogurt) o assumi bevande addizionate con calcio quando prende le compresse, perchè possono influenzare l'assorbimento del principio attivo.

Gravidanza e allattamento

E' preferibile evitare l'uso di Ciprofloxacina Pfizer durante la gravidanza.

Non prenda Ciprofloxacina Pfizer durante l'allattamento poichè la ciprofloxacina viene escreta con il latte materno e può essere pericolosa per il suo bambino.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Ciprofloxacina Pfizer può ridurre la sua attenzione. Possono verificarsi alcuni eventi avversi di natura neurologica. Quindi si accerti della sua reazione alla Ciprofloxacina Pfizer prima di guidare un veicolo o utilizzare un macchinario. Se ha dei dubbi, ne parli con il medico.

3. Come prendere Ciprofloxacina Pfizer

Il medico le spiegherà esattamente la dose di Ciprofloxacina Pfizer che dovrà prendere, oltre a dirle con quale frequenza e per quanto tempo farlo. Questo dipenderà dal tipo di infezione che l'ha colpita e dalla sua gravità.

Informi il medico se soffre di problemi renali, poichè ciò potrebbe richiedere un aggiustamento della dose.

Il trattamento dura solitamente da 5 a 21 giorni, ma può essere più lungo in caso di infezioni gravi.

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- Ingerisca le compresse con abbondante liquido. Non mastichi le compresse perché non hanno un sapore gradevole.
- Provi a prendere le compresse ogni giorno alla stessa ora.

- c) Può prendere le compresse all'ora dei pasti o tra un pasto e l'altro. Il calcio che assume tramite i pasti non influenzerà seriamente l'assunzione. Tuttavia, **non** prenda le compresse di Ciprofloxacina Pfizer insieme a latticini come latte o yogurt o con succhi di frutta arricchiti (es. succhi d'arancio arricchiti con calcio).

Si ricordi di assumere Ciprofloxacina Pfizer bevendo una quantità abbondante di liquidi.

Se prende più Ciprofloxacina Pfizer di quanto deve

- Se prende una dose maggiore di quella prescritta, ricorra immediatamente all'aiuto di un medico. Se possibile, porti con sé le compresse o la loro confezione per mostrarla al medico.

Se dimentica di prendere Ciprofloxacina Pfizer

- Prenda la dose normale appena possibile, e poi continui come prescritto. Comunque, se è quasi l'ora della dose successiva, non prenda la dose dimenticata e continui come al solito. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Si assicuri di completare il ciclo di trattamento.

Se interrompe il trattamento con Ciprofloxacina Pfizer

- E' importante che **finisca il ciclo di trattamento** anche se comincia a sentirsi meglio dopo pochi giorni. Se interrompe il trattamento con questo medicinale troppo presto, la sua infezione può non essere completamente curata e i suoi sintomi possono ripresentarsi o peggiorare. Può anche sviluppare resistenza all'antibiotico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (possono colpire fino a 1 su 10 utilizzatori):

- nausea, diarrea
- dolori articolari nei bambini

Effetti indesiderati non comuni (possono colpire fino a 1 su 100 utilizzatori):

- superinfezioni fungine
- un'alta concentrazione di eosinofili, un tipo di globuli bianchi
- perdita di appetito (anoressia)
- iperattività o agitazione
- mal di testa, capogiro, problemi di sonno, o disturbi del gusto
- vomito, dolore addominale, problemi di digestione come mal di stomaco (indigestione/bruciore di stomaco), o aerofagia
- aumento della quantità di alcune sostanze nel sangue (transaminasi e/o bilirubina)
- eruzione cutanea, prurito, o orticaria
- dolore articolare negli adulti
- scarsa funzione renale
- dolori a muscoli e ossa, malessere (astenia), o febbre
- aumento della fosfatasi alcalina nel sangue (una particolare sostanza presente nel sangue)

Effetti indesiderati rari (possono colpire fino a 1 su 1000 utilizzatori):

- infiammazione dell'intestino (colite) collegata all'utilizzo di antibiotici (che può essere fatale in casi molto rari) (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)
- alterazioni dei valori ematici (leucopenia, leucocitosi, neutropenia, anemia), aumento o riduzione dei valori di un fattore di coagulazione del sangue (trombociti)
- reazione allergica, gonfiore (edema), o rapido rigonfiamento della cute e delle membrane mucose (angioedema)
- aumento dello zucchero nel sangue (iperglicemia)

- confusione, disorientamento, reazioni d'ansia, sogni alterati, depressione che in rari casi può portare a pensieri suicidari o comportamento suicidario o allucinazioni
- formicolio, insolita sensibilità agli stimoli sensoriali, diminuzione della sensibilità della pelle, tremori, convulsioni (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni), o stordimento
- problemi della vista
- tinnito, perdita dell'udito, problemi dell'udito
- battito cardiaco accelerato (tachicardia)
- espansione dei vasi sanguigni (vasodilatazione), pressione sanguigna bassa, o svenimento
- respiro corto, inclusi sintomi asmatici
- disturbi del fegato, ittero (ittero colestatico), o epatite
- sensibilità alla luce (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)
- dolore muscolare, infiammazione delle articolazioni, aumento del tono muscolare, o crampi
- insufficienza renale, sangue o cristalli nell'urina (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni), infiammazione del tratto urinario
- ritenzione dei liquidi o sudorazione eccessiva
- aumento dei livelli dell'enzima amilasi

Effetti indesiderati molto rari (possono colpire fino a 1 su 10.000 utilizzatori):

- un tipo particolare di riduzione del numero di globuli rossi (anemia emolitica); una diminuzione pericolosa del numero di globuli bianchi (agranulocitosi); una diminuzione pericolosa del numero di globuli bianchi, rossi e delle piastrine (pancitopenia), che può essere fatale; e depressione del midollo osseo, che può anche essere fatale (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)
- reazioni allergiche gravi (reazioni anafilattiche o shock anafilattico, che può essere fatale – malattia del siero) (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)
- disturbi mentali (reazioni psicotiche) che in rari casi possono portare a pensieri di suicidio o comportamento suicida (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)
- emicrania, disturbi della coordinazione, passo incerto (disturbi della deambulazione), disordini del senso dell'olfatto (disturbi olfattivi), pressione cerebrale (pressione intracranica)
- distorsione visiva dei colori
- infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni (vasculite)
- pancreatite
- morte delle cellule epatiche (necrosi epatica) che molto raramente può portare a insufficienza epatica pericolosa per la vita
- piccolo sanguinamento puntiforme sotto la pelle (petecchie); vari tipi di eruzioni cutanee o rash (ad esempio, la sindrome di Stevens-Johnson potenzialmente fatale o la necrolisi epidermica tossica)
- debolezza muscolare, infiammazione dei tendini, rottura dei tendini – soprattutto dei tendini grandi sul retro della caviglia (tendine di Achille) (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni); peggioramento dei sintomi di miastenia grave (vedere paragrafo 2: Avvertenze e precauzioni)

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- problemi associati al sistema nervoso come dolore, bruciore, formicolio, intorpidimento e/o debolezza delle estremità
- problemi cardiaci; ritmo cardiaco anormale accelerato, ritmo cardiaco irregolare pericoloso per la vita, alterazione del ritmo cardiaco (chiamata "prolungamento dell'intervallo QT", visualizzato all'ECG, attività elettrica del cuore)
- pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) – disturbo della cute con vesciche rosse sulla pelle
- aumenti della diluizione del sangue se assunta con anti-coagulanti come warfarin

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

5. Come conservare Ciprofloxacina Pfizer

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta o sulla scatola dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ciprofloxacina Pfizer

- Il principio attivo è ciprofloxacina (come ciprofloxacina cloridrato).
Ciascuna compressa rivestita con film contiene 250 mg di ciprofloxacina (come ciprofloxacina cloridrato).
Ciascuna compressa rivestita con film contiene 500 mg di ciprofloxacina (come ciprofloxacina cloridrato).
Ciascuna compressa rivestita con film contiene 750 mg di ciprofloxacina (come ciprofloxacina cloridrato).
- Gli altri componenti sono:
Nucleo della compressa: Cellulosa microcristallina, Amido di sodio glicolato (Tipo A), Povidone (K 30), Silice (colloidale anidra), Magnesio stearato.
Film di rivestimento: Ipromellosa, Macrogol (400), Titanio diossido.

Descrizione dell'aspetto di Ciprofloxacina Pfizer e contenuto della confezione

Compressa rivestita con film

Ciprofloxacina Pfizer 250 mg

Comprese rivestite con film, bianche o quasi bianche, rotonde, con una linea di incisione su un lato e sull'altro lato impressi "F" e "23" separati da una linea di incisione.

La linea di incisione serve ad agevolare la rottura della compressa se si hanno difficoltà ad ingerirla intera, e non per dividerla in due parti uguali.

Ciprofloxacina Pfizer 500 mg

Comprese rivestite con film, bianche o quasi bianche, a forma di capsula, con una linea di incisione su un lato ed impresso "F 22" sull'altro.

La compressa può essere divisa in parti uguali.

Ciprofloxacina Pfizer 750 mg

Comprese rivestite con film, bianche o quasi bianche, a forma di capsula, con impresso "C" su un lato e "93" sull'altro lato.

Blister in PVC/PVDC rivestito con foglio di alluminio, confezionato in una scatola di cartone.

Confezioni:

250 mg e 750 mg: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 e 120 compresse rivestite con film

500 mg: 1, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 e 120 compresse rivestite con film

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Pfizer Italia S.r.l.

Via Isonzo, 71

04100 Latina

Produttori

Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei 10
B-1930 Zaventem, Belgio

Pfizer Italia S.r.l.
Marino del Tronto
Ascoli Piceno

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Austria:	Ciprofloxacina "Pfizer" 250 mg/500 mg/750 mg Filmtabletten
Belgio:	Ciprofloxacine Pfizer 250 mg/500 mg/750 mg comprimés pelliculés
Francia:	Ciprofloxacine Pfizer 250 mg comprimé pelliculé/500 mg comprimé pelliculé sécable/750 mg, comprimé pelliculé
Ungheria:	Ciprofloxacina Pfizer 250 mg/500 mg/750 mg filmtabletta
Italia:	Ciprofloxacina Pfizer
Norvegia:	Ciprofloxacina Pfizer 250 mg/500 mg/750 mg tabletter, filmdrasjerte
Spagna:	CIPROFLOXACINO PHARMACIA 250 mg/500 mg/750 mg comprimidos recubiertos con película
Svezia:	Ciprofloxacina Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg filmdragerade tabletter
Regno Unito:	Ciprofloxacina 250 mg/ 500 mg/ 750 mg film-coated tablets

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 02/2013

Informazioni/raccomandazioni mediche

Gli antibiotici vengono utilizzati per curare le infezioni batteriche. Essi sono inefficaci contro le infezioni virali. Se il medico le ha prescritto antibiotici, questo è esattamente ciò di cui ha bisogno per il disturbo di cui sta soffrendo. Nonostante gli antibiotici, alcuni batteri possono sopravvivere o crescere. Questo fenomeno è chiamato resistenza: alcuni trattamenti antibiotici diventano inefficaci. L'utilizzo errato di antibiotici aumenta la resistenza. E' possibile persino che lei aiuti i batteri a diventare resistenti e quindi ritardi la sua cura o diminuisca l'efficacia dell'antibiotico se non rispetta gli appropriati:

- dosi
- schemi posologici
- durata del trattamento

Di conseguenza, per mantenere l'efficacia di questo medicinale:

- 1 – Utilizzi gli antibiotici solo quando prescritti.
- 2 – Segua strettamente la prescrizione.
- 3 – Non ri-utilizzi un antibiotico senza prescrizione medica, anche se vuole trattare un disturbo simile.
- 4 – Non dia mai il suo antibiotico ad un'altra persona; potrebbe non essere adatto per il suo disturbo.
- 5 – Dopo aver completato il trattamento, riporti tutti i medicinali non utilizzati presso una farmacia affinché vengano opportunamente eliminati.