

Foglietto illustrativo

**AVIRASE 5% crema**  
**Aciclovir**

**COMPOSIZIONE**

*100 g di crema dermatologica al 5% contengono:*

principio attivo: Aciclovir g 5

eccipienti: Esteri poliglicolici di acidi grassi, deciloleato, polietilenglicole 1000 monocetiletere, alcol cetilico, alcol feniletilico, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acqua deionizzata.

**FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Crema per uso cutaneo – tubo da 3 g di crema al 5% - tubo da 10 g di crema al 5%

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Antivirali per uso dermatologico (ATC D06BB03).

**TITOLARE DELL'AURORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Lampugnani Farmaceutici S.p.A. Via Gramsci 4 , 20014 Nerviano (Milano)

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

Lisapharma S.p.A., Via Licinio 11, 22036 Erba (Como).

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex, quali Herpes genitalis primario e ricorrente ed Herpes labialis.

**CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

**PRECAUZIONI PER L'USO**

Il prodotto non è per uso oftalmico, non applicare sulle mucose della bocca e della vagina perché può dare origine a irritazioni.

Poiché i dati clinici circa la somministrazione di AVIRASE 5% crema in gravidanza sono limitati, durante tale periodo il prodotto deve essere somministrato soltanto in casi di assoluta necessità sotto il diretto controllo del medico.

Non sono disponibili dati circa i livelli di Aciclovir che potrebbero ritrovarsi nel latte materno dopo somministrazione di AVIRASE5% crema durante l'allattamento.

L'uso specie se prolungato del prodotto può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione, ove ciò accada occorre interrompere il trattamento e consultare il medico curante.

**INTERAZIONI**

Il Probenecid aumenta l'emivita media e l'area sotto la curva delle concentrazioni plasmatiche dell'Aciclovir. Altri farmaci che interferiscono sulla funzionalità renale potrebbero modificare la farmacocinetica dell'Aciclovir.

**AVVERTENZE SPECIALI**

L'alcool cetilico presente come eccipiente può causare reazioni cutanee (es. dermatite da contatto)

### **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

AVIRASE 5% crema deve essere applicato cinque volte al giorno ad intervalli di quattro ore. La terapia va iniziata il più precocemente possibile e nelle infezioni ricorrenti durante la fase prodromica o all'apparire delle prime lesioni.

### **SOVRADOSAGGIO**

L'Aciclovir è solo parzialmente assorbito a livello intestinale. E' perciò improbabile che si abbiano effetti tossici gravi anche nella eventualità che 5 g di Aciclovir vengano ingeriti in una sola volta. Non sono disponibili dati sulle eventuali conseguenze della ingestione di dosi maggiori.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

Bruciori, dolori transitori, eritema, secchezza e desquamazione nel punto di applicazione della crema.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato anche non descritto nel foglio illustrativo.

### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE:

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore ai 25°C.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'AIFA  
Maggio 2008