

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Genurin 200 mg compresse rivestite con film

flavossato cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Genurin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Genurin
3. Come prendere Genurin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Genurin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Genurin e a cosa serve

Genurin contiene il principio attivo flavossato cloridrato. Appartiene a un gruppo di medicinali chiamati "antispastici urinari" e agisce rilassando la muscolatura delle parti genitali e urinarie.

Genurin si usa:

- nel trattamento di sintomi quali: difficoltà ad urinare (disuria), urgenza di urinare, bisogno di urinare durante il riposo notturno (nicturia), dolore sopra ai genitali, frequenza e incontinenza urinarie nelle malattie della vescica e della prostata (cistiti, cistalgie, prostatiti, uretriti, uretrocistiti, uretrotrigoniti)
- insieme ad altri medicinali, nel trattamento degli spasmi (contrazioni) dovuti ai calcoli ai reni e ai condotti che trasportano l'urina dai reni alla vescica (ureteri), all'uso di cateteri urinari e dopo particolari esami diagnostici (cistoscopie), nonché alle conseguenze di interventi chirurgici alle basse vie urinarie
- nel trattamento degli spasmi delle vie genitali femminili come il dolore alla pelvi, i dolori mestruali (dismenorrea) e le contrazioni dell'utero (ipertonica e discinesia uterine).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Genurin

Non prenda Genurin

- se è allergico a flavossato cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha un disturbo allo stomaco o all'intestino che influenza il normale passaggio del cibo (ostruzione)
- se ha sanguinamenti allo stomaco o all'intestino
- se ha un'incapacità muscolare a deglutire (acalasia)
- se non riesce a svuotare completamente la vescica (ritenzione urinaria)
- se è in trattamento per una malattia dell'occhio chiamata glaucoma
- se ha una malattia che causa debolezza generale e affaticamento dei muscoli (miastenia grave).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Genurin:

- se ha problemi ai reni.

Bambini

Genurin non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 12 anni di età.

Altri medicinali e Genurin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

La sicurezza di questo medicinale durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. Se è incinta o sta allattando, questo medicinale non è raccomandato.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non guidi o utilizzi macchinari se avverte sonnolenza o annebbiamento alla vista con l'uso di Genurin.

Genurin contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Genurin

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 compressa rivestita con film da 200 mg, 3-4 volte al giorno, per via orale.

Non rompa la compressa ma la deglutisca intera, preferibilmente con un bicchiere d'acqua. Le compresse devono essere prese dopo un pasto per prevenire la nausea.

Se prende più Genurin di quanto deve

Se accidentalmente prende troppe compresse di Genurin, contatti immediatamente il medico o l'ospedale.

Se dimentica di prendere Genurin

Se dimentica una dose non si preoccupi, prenda la dose successiva alla solita ora. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con Genurin

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato di seguito, informi il medico o il farmacista:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

Nausea

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

Sonnolenza

Compromissione della visione

Vomito, bocca secca, dolore gastrico e disturbi allo stomaco (dispepsia)

Eruzione cutanea

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1000)

Orticaria, prurito

Incapacità a svuotare completamente la vescica (ritenzione urinaria)

Affaticamento

Non nota (la frequenza non può definita sulla base dei dati disponibili)

Ipersensibilità, reazione anafilattica, shock anafilattico

Stato confusionale

Glaucoma

Battito cardiaco veloce o irregolare (dette palpitazioni)

Colorito giallo della pelle e degli occhi (ittero), disturbi del fegato, risultati anomali dei test di funzionalità del fegato (enzimi epatici anormali)

Arrossamento (della pelle).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Genurin

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota che è danneggiato o se la confezione mostra segni di manomissione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Genurin

- Il principio attivo è flavossato cloridrato. Ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di flavossato cloridrato.
- Gli altri componenti sono:
 - Nucleo: lattosio monoidrato, sodio carbossimetilamido, povidone, talco, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.
 - Rivestimento: ipromellosa, cellulosa microcristallina, macrogol 6000, macrogol stearato, titanio diossido (E171), magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di Genurin e contenuto della confezione

Genurin si presenta in forma di compresse rivestite con film.

È disponibile in confezione da 30 compresse in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 – 20148 Milano.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco