

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Agenzia Italiana del Farmaco

## **REMEFLIN 20** **dimeflina**

### **COMPOSIZIONE**

#### **REMEFLIN 20**

100 ml di soluzione contengono

#### Principio attivo

Dimeflina cloridrato 2,0 g

#### Eccipienti

Sodio saccarinato biidrato, Glicerina, Alcool, Acqua depurata.

### **PRESENTAZIONI**

Flacone contagocce da 20 ml di soluzione di dimeflina al 20 per mille.

### **ATTIVITÀ**

Il REMEFLIN contiene dimeflina, un analettico respiratorio ad azione intensa e prolungata che favorisce l'eliminazione dell'anidride carbonica e la saturazione del sangue in ossigeno. Inoltre, attivando la ventilazione polmonare, migliora il lavoro cardiaco ed elimina le conseguenze negative sull'apparato cardiovascolare dell'insufficienza respiratoria.

### **TITOLARE A.I.C.**

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - via Civitali 1 – Milano.

### **PRODUTTORE**

RECORDATI S.p.A. - Officina Farmaceutica di Milano – via Civitali, 1.

### **INDICAZIONI**

- Stati di insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria in generale;
- broncopneumopatie, bronchite asmatica, enfisema polmonare;
- cardiopatie, cuore polmonare, cuore senile;
- degenze prolungate;
- stati postoperatori;
- disturbi da anossia cerebrale negli arteriosclerotici;
- depressione respiratoria in chirurgia e anesthesiologia;
- carbonaricosi e stati di acidosi respiratoria;
- intossicazione da barbiturici, morfina, ossido di carbonio;
- coadiuvante dell'ossigeno-terapia.

### **CONTROINDICAZIONI**

REMEFLIN è controindicato nei pazienti affetti da epilessia e nei pazienti nei quali sia stata accertata una ipersensibilità verso il prodotto.

### **PRECAUZIONI**

L'uso di Remeflin è preferibilmente da evitare durante la gravidanza e l'allattamento.

### **INTERAZIONI**

È dimostrato, sperimentalmente e clinicamente, un antagonismo reciproco fra REMEFLIN e barbiturici.

## AVVERTENZE

Non è consigliabile la somministrazione nei bambini.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

## DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

10-20 gocce 2-3 volte al giorno.

Le gocce di REMEFLIN 20 vanno disciolte in un poco d'acqua zuccherata o fatte assorbire su una zolletta di zucchero e prese, indipendentemente dai pasti, ad intervalli regolari nella giornata.

## SOVRADOSAGGIO

I segni di sovradosaggio sono generalmente lievi e non richiedono alcun trattamento in quanto regrediscono spontaneamente diminuendo la dose. Eventuali casi di intossicazione per ingestione accidentale devono essere trattati con barbiturici.

## EFFETTI INDESIDERATI

Irrequietezza psichica, eccitazione nervosa, tremori muscolari sono sintomi di sovradosaggio che recedono diminuendo la dose.

*COMUNICARE AL MEDICO O AL FARMACISTA L'INSORGENZA DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI NON DESCRITTI NEL PRESENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO*

Controllare la data di scadenza sulla confezione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata.

Data di ultima revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Settembre 2009

## ISTRUZIONI PER L'APERTURA

1) Per aprire, premere e contemporaneamente svitare.

2) Per chiudere, avvitare.

