

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Antoral Gola 5 mg pastiglie Antoral Gola 5 mg/10 ml spray

tibenzonio ioduro

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Antoral Gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Antoral Gola
3. Come prendere Antoral Gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Antoral Gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Antoral Gola e a cosa serve

Antoral Gola contiene il principio attivo tibenzonio ioduro.

Antoral Gola è attivo contro i microbi presenti nella bocca.

Antoral Gola si usa:

- come disinfettante della gola, della bocca e delle gengive (antisettico del cavo orale)
- prima e dopo estrazioni dei denti.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Antoral Gola

Non prenda Antoral Gola

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
 - se è allergico ad altri medicinali dello stesso tipo (antisettici del cavo orale) in particolare dequalinio cloruro, cetilpiridinio cloruro, benzoxonio cloruro, benzetonio cloruro
- Non somministri questo medicinale a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Consulti il medico:

- se è in gravidanza o sta allattando (vedere "Gravidanza e allattamento")
- se il medicinale deve essere somministrato ad un bambino di età superiore a 6 anni.
Nei bambini di età superiore a 6 anni, Antoral Gola deve essere usato solo dopo avere consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Antoral Gola.

Eviti di bere durante o subito dopo l'uso di Antoral Gola.

L'uso, specie se prolungato di medicinali per uso locale, può dare origine ad un aumento della sensibilità nella zona dove è somministrato il medicinale. In tal caso interrompa l'uso del medicinale e consulti il medico che le darà una terapia adatta.

Altri medicinali e Antoral Gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Antoral Gola può essere associato a qualsiasi trattamento, medicinale (chemioterapico o antibiotico) o chirurgico necessario per la presenza di eventuali infezioni (complicazioni settiche generali) o per particolari situazioni cliniche.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Usi Antoral Gola durante la gravidanza e l'allattamento solo dopo avere consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono note interferenze sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Antoral Gola pastiglie (gusto menta, gusto albicocca, gusto balsamico, gusto miele-limone) contengono una miscela maltosio-gluosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Antoral Gola pastiglie gusto albicocca contiene aspartame

Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

Antoral Gola pastiglie gusto albicocca contiene E110. Può causare reazioni allergiche.

Antoral Gola pastiglie gusto menta senza zucchero contiene sorbitolo

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale

Antoral Gola spray contiene alcool.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico, come Antoral Gola spray, può determinare positività ai test antidoping in funzione della concentrazione di alcool nel sangue indicata da alcune federazioni sportive.

3. Come prendere Antoral Gola

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Antoral Gola 5 mg pastiglie

(nelle confezioni gusto menta, gusto menta senza zucchero, gusto albicocca, gusto balsamico, gusto miele-limone)

Quanto

La dose raccomandata è di 4-6 pastiglie al giorno.

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Una pastiglia ogni 2-3 ore, ad intervalli regolari.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: prenda il medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

Come

Le pastiglie di Antoral Gola non devono essere masticate, ma lasciate sciogliere lentamente in bocca.

Antoral Gola 5 mg/10 ml spray

Quanto

La dose raccomandata è di 2 spruzzi di soluzione per ogni applicazione.

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.


Quando e per quanto tempo

L'applicazione deve essere ripetuta 3 volte al giorno, ad intervalli regolari.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: prenda il medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

Come



1. Ruoti il beccuccio del flacone lateralmente



2. Carichi la pompa premendo il tasto due o tre volte

3. Introduca il beccuccio in bocca e diriga lo spruzzo verso la zona infiammata.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Nei bambini al di sopra dei 6 anni sono impiegabili le dosi analoghe a quelle degli adulti.

Nei bambini di età inferiore a 6 anni, Antoral Gola non è indicato.

Se usa più Antoral Gola di quanto deve

Occasionalmente, per dosi molto elevate, si può avere eccessiva salivazione (lieve scialorrea), diminuzione del gusto e diminuzione dell'appetito.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Antoral Gola avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Antoral Gola

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Antoral Gola

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alle dosi terapeutiche non sono segnalati effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Antoral Gola

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Antoral Gola spray ha validità di 3 mesi dal primo utilizzo.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Antoral Gola

Antoral Gola 5 mg pastiglie (confezione gusto menta)

- Il principio attivo è: tibenazonio ioduro. Ogni pastiglia contiene 5 mg di tibenazonio ioduro
- Gli altri componenti sono: aroma menta, ammonio glicirrinato, mannite, magnesio stearato, miscela maltosio-glucosio.

Antoral Gola 5 mg pastiglie (confezione gusto albicocca)

- Il principio attivo è: tibenazonio ioduro. Ogni pastiglia contiene 5 mg di tibenazonio ioduro
- Gli altri componenti sono: aroma albicocca, aroma mango, aspartame, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, miscela maltosio/glucosio, E110 (lacca).

Antoral Gola 5 mg pastiglie 5 mg (confezione gusto balsamico)

- Il principio attivo è: tibenazonio ioduro. Ogni pastiglia contiene 5 mg di tibenazonio ioduro
- Gli altri componenti sono: ammonio glicirrinato, aroma balsamico, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, miscela maltosio/glucosio, verde lacca (E104 ed E132).

Antoral Gola 5 mg pastiglie (confezione gusto miele-limone)

- Il principio attivo è: tibenazonio ioduro. Ogni pastiglia contiene 5 mg di tibenazonio ioduro

- Gli altri componenti sono: aroma miele, aroma limone, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, miscela maltosio/glucosio, E104 (lacca).

Antoral Gola 5 mg pastiglie (confezione gusto menta senza zucchero)

- Il principio attivo è: tibenzonio ioduro. Ogni pastiglia contiene 5 mg di tibenzonio ioduro
- Gli altri componenti sono: aroma menta, ammonio glicirrinato, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, olio vegetale idrogenato, magnesio carbonato.

Antoral Gola 5 mg/10 ml spray

- Il principio attivo è: tibenzonio ioduro. 10 ml di spray contengono 5 mg di tibenzonio ioduro. Uno spruzzo contiene 0,1 mg di tibenzonio ioduro.
- Gli altri componenti sono: polisorbato 20, dietilenglicole monoetiletere, alcool, saccarina, aroma acqua tonica, dimetilpolisilossano (emulsione al 10%), E 104, E 131, trietanolamina, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Antoral Gola e contenuto della confezione

Antoral Gola pastiglie è disponibile in confezione da 20 pastiglie al gusto di menta, menta senza zucchero, albicocca, balsamico, miele-limone.

Antoral Gola spray è disponibile in confezione da un flaconcino da 15 ml di vetro ambrato munito di erogatore nebulizzatore.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Antoral Gola 5 mg/10 ml collutorio

tibenzonio ioduro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Antoral Gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Antoral Gola
3. Come usare Antoral Gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Antoral Gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Antoral Gola e a cosa serve

Antoral Gola contiene il principio attivo tibenzonio ioduro.

Antoral Gola è attivo contro i microbi presenti nella bocca.

Antoral Gola si usa:

- come disinfettante della gola, della bocca e delle gengive (antisettico del cavo orale)
- prima e dopo estrazioni dei denti.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Antoral Gola

Non usi Antoral Gola

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
 - se è allergico ad altri medicinali dello stesso tipo (antisettici del cavo orale) in particolare dequalinio cloruro, cetilpiridinio cloruro, benzoxonio cloruro, benzetonio cloruro
- Non somministri questo medicinale a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Consulti il medico:

- se è in gravidanza o sta allattando (vedere "Gravidanza e allattamento")
se il medicinale deve essere somministrato ad un bambino di età superiore a 6 anni. Nei bambini di età superiore a 6 anni, Antoral Gola deve essere usato solo dopo avere consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Antoral Gola.

Eviti di bere subito dopo l'uso di Antoral Gola.

L'uso, specie se prolungato di medicinali per uso locale, può dare origine ad un aumento della sensibilità nella zona in cui è somministrato il medicinale. In tal caso interrompa l'uso del medicinale e consulti il medico che le darà una terapia adatta.

Altri medicinali e Antoral Gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Antoral Gola può essere associato a qualsiasi trattamento, medicinale (chemioterapico o antibiotico) o chirurgico necessario per la presenza di eventuali infezioni (complicazioni settiche generali) o per particolari situazioni cliniche.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usi Antoral Gola durante la gravidanza e l'allattamento solo dopo avere consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono note interferenze sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico, come Antoral Gola, può determinare positività ai test antidoping in funzione della concentrazione di alcool nel sangue indicata da alcune federazioni sportive.

3. Come usare Antoral Gola

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Quanto

La dose raccomandata è di 1 o 2 cucchiaini di prodotto puro o diluito al giorno (vedere Come)

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Per l'igiene della bocca sono sufficienti 2 sciacqui o gargarismi al giorno, uno al mattino l'altro alla sera.

Per un'azione più energica effettui sciacqui, gargarismi o pennellature più volte al giorno.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usi solo per brevi periodi di trattamento.

Come

Usi il prodotto puro per gargarismi e sciacqui in cui sia richiesta un'azione più energica; oppure diluisca il prodotto in un uguale volume di acqua per l'igiene della bocca o a scopo preventivo.

Sempre col prodotto puro è possibile effettuare pennellature.

Istruzioni per l'apertura del flacone



1) Per aprire, preme e contemporaneamente sviti



2) Per chiudere, preme e contemporaneamente avviti

Uso nei bambini e negli adolescenti

Nei bambini al di sopra dei 6 anni sono impiegabili le dosi analoghe a quelle degli adulti.

Nei bambini di età inferiore a 6 anni, Antoral Gola non è indicato.

Se usa più Antoral Gola di quanto deve

Occasionalmente, per dosi molto elevate, si può avere eccessiva salivazione (lieve scialorrea), diminuzione del gusto e diminuzione dell'appetito.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Antoral Gola avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Antoral Gola

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Antoral Gola

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alle dosi terapeutiche non sono segnalati effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Antoral Gola

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Antoral Gola collutorio

- Il principio attivo è: tibenzone ioduro. 10 ml di collutorio contengono 5mg di tibenzone ioduro
- Gli altri componenti sono: polisorbato 20, dietilenglicole monoetere, **alcol**, saccarina, aroma acqua tonica, emulsione siliconica antischiuma, E 104, E 131, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Antoral Gola e contenuto della confezione

Antoral Gola si presenta in forma di collutorio.

Il contenuto della confezione è un flacone da 200 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.

Produttore

DOPPEL Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (Piacenza).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA