

## Foglio illustrativo: informazioni l'utente

### Quik 708 mg/100 ml sospensione orale

Cloperastina fendizoato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Quik e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Quik
3. Come prendere Quik
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Quik
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Quik e a cosa serve**

Quik è un medicinale antitosse che contiene il principio attivo cloperastina fendizoato.

Questo medicinale è usato come calmante della tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni di trattamento

.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Quik**

##### **Non prenda Quik**

- se è allergico alla cloperastina fendizoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il suo bambino ha un'età inferiore ai 2 anni
- se è nei primi tre mesi di gravidanza (vedere "Gravidanza e allattamento").

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Quik se soffre di aumenti della pressione oculare (ipertensione intraoculare) se presenta un ingrossamento della prostata (ipertrofia prostatica) o ostruzione della vescica

#### **Altri medicinali e Quik**

---

QUIK fg-ill rev 2007(1)-4

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

E' necessaria cautela quando Quik è assunto in concomitanza con sostanze che deprimono o che stimolano il sistema nervoso centrale.

La contemporanea assunzione di medicinali che inducono sedazione e/o sonno (sedativi) o medicinali antiallergici (antistaminici) può potenziare gli effetti indesiderati di questo medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale. Non assuma Quik nei primi tre mesi di gravidanza e, nel successivo periodo di gravidanza, lo assuma solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Quik può, anche se raramente, causare sonnolenza. Pertanto presti particolare attenzione nel caso in cui volesse condurre veicoli o svolgere operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza.

### **Quik contiene parabeni**

Questo medicinale contiene parabeni (conservanti) quali metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **3. Come prendere Quik**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La **dose raccomandata** è:

**Adulti:** 5 ml tre volte al giorno.

### **Uso nei bambini e negli adolescenti:**

- tra 2 e 4 anni: 2 ml due volte al giorno;
- tra 4 e 7 anni: 3 ml due volte al giorno;
- tra 7 e 15 anni: 5 ml due volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate. La durata del trattamento non deve superare i 7 giorni. Se non si notano risultati apprezzabili si consiglia di consultare il medico.

### **Istruzioni per l'uso:**

- 1) Agiti bene il flacone prima dell'uso
- 2) Usi il misurino tarato da 2-3-5 ml annesso alla confezione

---

QUIK modifica stampati in risposta prot. AIFA PPA/FV/131374/P del 22/11/19

### **Se prende più Quik di quanto deve**

In caso di assunzione di dosi eccessive di questo medicinale, avverta immediatamente il medico o si rechi al più vicino ospedale. Il medico potrebbe decidere di sottoporla ad una lavanda gastrica o, qualora lei fosse eccessivamente eccitata, di somministrarle delle benzodiazepine (psicofarmaci).

### **Se dimentica di prendere Quik**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **Se interrompe il trattamento con Quik**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista

### **Quik contiene metile-paraidrossibenzoato (E218); propile-paraidrossibenzoato (E216)**

Possano causare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):-orticaria-eritema

Alle dosi più elevate sono state segnalate

**Frequenza non nota** (non può essere valutata in base ai dati disponibili):

-secchezza della bocca\*

-lieve sonnolenza\*

\* tali effetti indesiderati scompaiono rapidamente con la riduzione della dose.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Quik**

---

QUIK modifica stampati in risposta prot. AIFA PPA/FV/131374/P del 22/11/19

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più.

Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Quik**

- Il principio attivo è cloperastina fendizoato. 100 ml di sospensione contengono 708 mg di cloperastina fendizoato (pari a 400 mg di cloperastina cloridrato).
- Gli altri componenti sono: gomma xantana, poliossietilene stearato, xilitolo, **metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato**, aroma di banana, acqua deionizzata.

### **Descrizione dell'aspetto di Quik e contenuto della confezione**

Quik si presenta sotto forma di sospensione orale.

Il contenuto della confezione è un flacone di vetro da 200 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Valeas SPA - Industria Chimica e Farmaceutica - Via Vallisneri, 10 - 20133 Milano.

### **Produttore**

Mitim S.r.l. - Via Cacciamali, 34-36-38 - 25125 Brescia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il GG/MM/AAAA.**