

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

PARVISEDIL sciroppo

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è PARVISEDIL e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PARVISEDIL
3. Come usare PARVISEDIL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PARVISEDIL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è PARVISEDIL e a che cosa serve

PARVISEDIL contiene:

- acido gamma-amino-beta-idrossibutirrico, una sostanza normalmente presente nel cervello, che inibisce l'eccitabilità dei neuroni.
- estratti fluidi delle piante Valeriana, Passiflora, Camomilla e Biancospino. Queste piante sono tradizionalmente conosciute per i loro effetti sedativi e rilassanti, che favoriscono il sonno.

PARVISEDIL è utilizzato per trattare gli stati di irrequietezza, di ipereccitabilità e mancanza di sonno (insonnia) nei bambini.

Si rivolga al medico se non nota miglioramento o se nota un peggioramento dei sintomi del suo bambino dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare PARVISEDIL

Non usi PARVISEDIL

- se il suo bambino è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Parvisedil.

Altri medicinali e PARVISEDIL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta

allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

PARVISEDIL è un farmaco utilizzato per favorire il sonno nei bambini, pertanto la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari non sono pertinenti in questa fascia di età. Tenga tuttavia presente che l'effetto del medicinale è di leggera sedazione.

PARVISEDIL contiene:

- **metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato:** possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).
- **saccarosio:** Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale contiene 5 g di saccarosio per dose (un misurino da 10 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

3. Come usare PARVISEDIL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Non superi le dosi consigliate.

La dose raccomandata è di 2-4 misurini al giorno.

Istruzioni per l'uso:




Figura 1:

Per aprire il flacone: svitare la capsula sino a farla girare a vuoto, impugnare il flacone come in figura 1 e spingere la capsula obliquamente verso l'alto.

Attenzione: aprire con cautela, movimenti bruschi possono provocare la fuoriuscita del liquido.




Figura 2:

Per chiudere il flacone: posizionare la capsula sulla bocca del flacone come in figura 2, premere verso il basso sino a farla incastrare, quindi avvitare.

Se prende più Parvisedil di quanto deve

Non sono noti sintomi da riferirsi a sovradosaggio del farmaco

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

PARVISEDIL può provocare perdita dell'appetito (anoressia) transitoria.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare PARVISEDIL

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene PARVISEDIL

- I principi attivi sono: Acido gamma-amino-beta-idrossibutirrico; estratto fluido di Valeriana, estratto fluido di Passiflora, estratto fluido di Camomilla, estratto fluido di Biancospino. 1 ml di sciroppo contiene: 50 mg di acido gamma-amino-beta-idrossibutirrico, 50 mg di estratto fluido di Valeriana, 30 mg di estratto fluido di Passiflora, 55 mg di estratto fluido di Camomilla, 40 mg di estratto fluido di Biancospino
- Gli altri componenti sono: metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; saccarosio; arancio essenza; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di PARVISEDIL e contenuto della confezione

PARVISEDIL si presenta in un flacone da 200 ml con capsula di alluminio con chiusura a prova di bambino, e misurino trasparente in polipropilene.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il