

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TAUGLICOLO 0,4 mg/ml + 38,57 mg/ml sciroppo

bromexina cloridrato + potassio solfoguaiacolato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è TAUGLICOLO e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TAUGLICOLO
3. Come usare TAUGLICOLO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TAUGLICOLO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è TAUGLICOLO e a che cosa serve

Tauglicolo contiene le sostanze attive bromexina cloridrato e potassio solfoguaiacolato.

La bromexina cloridrato ha azione mucolitica, fluidifica cioè i depositi di muco viscoso nelle vie respiratorie e ne facilita così l'eliminazione; il potassio solfoguaiacolato riduce il gonfiore delle mucose delle vie respiratorie, aiutando a respirare meglio, ed ha un'azione disinfettante (antisettica). Questo medicinale favorisce l'eliminazione del catarro ed è indicato nel trattamento di tosse e catarro.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare TAUGLICOLO

Non usi TAUGLICOLO

- se è allergico alla bromexina, al potassio solfoguaiacolato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- nei bambini sotto i 2 anni di età (vedere paragrafo 2 "Bambini").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di usare TAUGLICOLO se ha una lesione dello stomaco (ulcera peptica). Il medico valuterà se questo medicinale è adatto a lei.

Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi associati alla somministrazione di bromexina.

Se si manifesta un rash cutaneo (comprese lesioni di membrane mucose come bocca, gola, naso, occhi, genitali), smetta di prendere TAUGLICOLO e si rivolga immediatamente al medico.

Bambini

Non usi TAUGLICOLO nei bambini sotto i 2 anni di età, perché le loro vie respiratorie non sono ancora mature e questo medicinale può causare un'ostruzione dei loro bronchi (ostruzione bronchiale), causando difficoltà a respirare.

Altri medicinali e TAUGLICOLO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è incinta o sta allattando non usi questo medicinale a meno che il medico l'abbia ritenuto necessario. Questo medicinale deve essere usato sotto il controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

TAUGLICOLO contiene:

- **etanolo:** Questo medicinale contiene 1,2 vol % etanolo (alcool), e cioè fino a 144 mg per dose, equivalenti a 3,6 ml di birra, 1,5 ml di vino per dose.
Può essere dannoso per gli alcolisti.
Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie del fegato o epilessia.
- Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.
- **metile paraidrossibenzoato:** può causare reazioni allergiche (anche ritardate).
- **saccarosio:** Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene 9 g di saccarosio per dose (un cucchiaino) o 6 g di saccarosio per dose (un cucchiaino). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

3. Come usare TAUGLICOLO

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata **negli adulti** è 4 - 5 cucchiaini di sciroppo al giorno diluiti in acqua zuccherata.

Uso nei bambini di età superiore a 2 anni

La dose raccomandata è 4 - 5 cucchiaini di sciroppo al giorno diluiti in acqua zuccherata.

Assuma questo medicinale possibilmente dopo i pasti.

Se usa più TAUGLICOLO di quanto deve

Se assume una dose eccessiva di TAUGLICOLO **avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Con l'uso di questo medicinale sono stati inoltre riportati i seguenti effetti indesiderati:

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000):

- Reazioni di ipersensibilità
- Rash, orticaria

Non nota (frequenza non stimabile sulla base dei dati disponibili):

- Reazioni anafilattiche tra cui shock anafilattico, angioedema (gonfiore a rapido sviluppo della pelle, dei tessuti sottocutanei, della mucosa e dei tessuti sottomucosi) e prurito;
- Reazioni avverse cutanee gravi (tra cui eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica e pustolosi esantematica acuta generalizzata;
- Disturbi allo stomaco e all'intestino.
- Ostruzione dei bronchi (ostruzione bronchiale) che causa difficoltà a respirare

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga

al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TAUGLICOLO

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TAUGLICOLO

- I principi attivi sono bromexina cloridrato e potassio solfoguaiacolato. 1 ml di sciroppo contiene 0,4 mg di bromexina cloridrato (corrispondenti a 0,36 mg di bromexina base) e 38,57 mg di potassio solfoguaiacolato.
- Gli altri componenti sono acido citrico, etanolo 96 per cento, amaro G.M., aroma spezie vanigliate, aroma Wild Cherry, metile paraidrossibenzoato, saccarosio, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di TAUGLICOLO e contenuto della confezione

TAUGLICOLO si presenta come sciroppo in un flacone di vetro da 150 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TAUGLICOLO adulti 6 mg + 120,52 mg supposte
TAUGLICOLO bambini 3 mg + 57,85 mg supposte

bromexina cloridrato + potassio solfoguaiacolato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è TAUGLICOLO e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TAUGLICOLO
3. Come usare TAUGLICOLO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TAUGLICOLO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è TAUGLICOLO e a che cosa serve

TAUGLICOLO contiene le sostanze attive bromexina cloridrato e potassio solfoguaiacolato. La bromexina cloridrato ha azione mucolitica, fluidifica cioè i depositi di muco viscoso nelle vie respiratorie e ne facilita così l'eliminazione; il potassio solfoguaiacolato riduce il gonfiore delle mucose delle vie respiratorie, aiutando a respirare meglio, ed ha un'azione disinfettante (antisettica). Questo medicinale favorisce l'eliminazione del catarro ed è indicato nel trattamento di tosse e catarro.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare TAUGLICOLO

Non usi TAUGLICOLO

- se è allergico alla bromexina, al potassio solfoguaiacolato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- nei bambini sotto i 2 anni di età (vedere paragrafo 2 "Bambini").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di usare TAUGLICOLO se ha una lesione dello stomaco (ulcera peptica). Il medico valuterà se questo medicinale è adatto a lei.

Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi associati alla somministrazione di bromexina.

Se si manifesta un rash cutaneo (comprese lesioni di membrane mucose come bocca, gola, naso, occhi, genitali), smetta di usare TAUGLICOLOR e si rivolga immediatamente al medico.

Bambini

Non usi TAUGLICOLOR nei bambini sotto i 2 anni di età, perché le loro vie respiratorie non sono ancora mature e questo medicinale può causare un'ostruzione dei loro bronchi (ostruzione bronchiale), causando difficoltà a respirare.

Altri medicinali e TAUGLICOLOR

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è incinta o sta allattando non usi questo medicinale a meno che il medico l'abbia ritenuto necessario. Questo medicinale deve essere usato sotto il controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come usare TAUGLICOLOR

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata **negli adulti** è 1 supposta di TAUGLICOLOR adulti supposte 2 o 3 volte al giorno.

Uso nei bambini di età superiore a 2 anni

La dose raccomandata è 1 supposta di TAUGLICOLOR bambini supposte 2 o 3 volte al giorno.

Se usa più TAUGLICOLOR di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di TAUGLICOLOR **avverta immediatamente il medico** o si **rivolga al più vicino ospedale**.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Con l'uso di questo medicinale sono stati inoltre riportati i seguenti effetti indesiderati:

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000):

- Reazioni di ipersensibilità
- Rash, orticaria

Non nota (frequenza non stimabile sulla base dei dati disponibili):

- Reazioni anafilattiche tra cui shock anafilattico, angioedema (gonfiore a rapido sviluppo della pelle, dei tessuti sottocutanei, della mucosa e dei tessuti sottomucosi) e prurito;
- Reazioni avverse cutanee gravi (tra cui eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica e pustolosi esantematica acuta generalizzata);
- Disturbi allo stomaco e all'intestino.
- Ostruzione dei bronchi (ostruzione bronchiale) che causa difficoltà a respirare

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TAUGLICOLO

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TAUGLICOLO

TAUGLICOLO adulti supposte

- I principi attivi sono bromexina cloridrato e potassio solfoguaiacolato. Ciascuna supposta contiene 6 mg di bromexina cloridrato (corrispondenti a 5,46 mg di bromexina base) e 120,52 mg di potassio solfoguaiacolato.
- L'altro componente è: gliceridi semisintetici.

TAUGLICOLO bambini supposte

- I principi attivi sono bromexina cloridrato e potassio solfoguaiacolato. Ciascuna supposta contiene 3 mg di bromexina cloridrato (corrispondenti a 2,73 mg di bromexina base) e 57,85 mg di potassio solfoguaiacolato.
- L'altro componente è: gliceridi semisintetici.

Descrizione dell'aspetto di TAUGLICOLO e contenuto della confezione

TAUGLICOLO adulti 6 mg + 120,52 mg supposte si presenta in una scatola contenente un blister con 12 supposte.

TAUGLICOLO bambini 3 mg + 57,85 mg supposte si presenta in una scatola contenente un blister con 12 supposte.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV).

Produttore

DMS Farmaceutici S.p.a. - Via Provinciale per Lecco 78 – 22038 Tavernerio (CO).

Fulton Medicinali Spa – Via Marconi, 28/9 – ARESE (MI) (**)

(**) Il numero dei lotti prodotti da Fulton Medicinali è preceduto dalla lettera F.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco