

## CORTI ARSCOLLOID

### COMPOSIZIONE

**Concentrato** - 100 g contengono: *Nel tappo dosatore*: PRINCIPI ATTIVI: argento proteinato al 70% in Ag g 2,000; desametasone fosfato bisodico g 0,100. ECCIPIENTI: mannitolo. *Nel flacone*: PRINCIPI ATTIVI: 2,4-diclorobenzil alcool g 1,000. ECCIPIENTI: glicerina; essenza di rosa; acqua depurata; alcool etilico 96°; glicole propilenico.

**Gengivario** - 100 g contengono: *Nel tappo dosatore*: PRINCIPI ATTIVI: argento proteinato al 70% in Ag g 1,000; desametasone fosfato bisodico g 0,100. ECCIPIENTI: mannitolo. *Nel flacone*: PRINCIPI ATTIVI: 2,4-diclorobenzil alcool g 0,500. ECCIPIENTI: glicerina; essenza di rosa; acqua depurata; alcool etilico 96°; glicole propilenico.

**Collutorio-gargarismo** - 100 g contengono: *Nel tappo dosatore*: PRINCIPI ATTIVI: argento proteinato al 70% in Ag g 2,000; desametasone fosfato bisodico g 0,100. ECCIPIENTI: mannitolo. *Nel flacone*: PRINCIPI ATTIVI: 2,4-diclorobenzil alcool g 0,500. ECCIPIENTI: glicerina; essenza di rosa; acqua depurata; alcool etilico 96°; glicole propilenico.

### FORMA FARMACEUTICA

Concentrato: flacone da g 10.

Gengivario: flacone da g 10.

Collutorio-gargarismo: flacone da g 20.

**CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA** - Stomatologico antinfiammatorio del cavo orale.

**TITOLARE AIC E PRODUTTORE**: Lab. Farm. SIT srl - Via Cavour 70 - MEDE (PV).

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE** - Terapia topica delle stomatiti di origine batterica accompagnate da evidente reazione infiammatoria.

**CONTROINDICAZIONI** - I preparati contenenti corticosteroidi sono generalmente controindicati nella tubercolosi e nelle infezioni micotiche e virali nella sede di applicazione. Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

**OPPORTUNE PRECAUZIONI D'IMPIEGO** - Non è consigliabile l'uso del prodotto in bambini in età inferiore a 10 anni. Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. Il prodotto non è per uso oftalmico e ne è sconsigliato l'impiego ininterrotto per oltre cinque giorni senza consultare il medico.

**INTERAZIONI** - Nessuna nota.

**AVVERTENZE** - L'impiego specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione ed eccezionalmente agli effetti collaterali sistemici classici del medicamento. In tal caso sospendere il trattamento e consultare il medico.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

**EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE E SULL'USO DI MACCHINE** - Nessuno.

### **POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO**

**Concentrato - Gengivario:** si applica localmente una o più volte al giorno, secondo prescrizione del Medico lasciando agire per 10-15 minuti.

Viene portato direttamente sui punti delle lesioni con un piccolo batuffolo di cotone, avendo cura di farlo penetrare in tutti gli interstizi e nello scollamento della gengiva il più profondamente possibile.

**Collutorio-gargarismo:** dieci gocce in un terzo di bicchiere d'acqua bastano per preparare un gargarismo-collutorio. Da usare una o più volte al giorno secondo prescrizione medica.

NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

### **MODALITÀ D'USO**

- Svitare la capsula di alluminio
- premere il pistone colorato fino ad ottenere la caduta della polvere nel liquido
- agitare bene fino a completa dispersione
- togliere dallo stantuffo il coperchietto soprastante ed erogare direttamente nel bicchiere (collutorio-gargarismo) o su un piccolo batuffolo di cotone (gengivario, concentrato) il numero di gocce necessarie
- per richiudere, dopo l'uso, inserire il coperchietto a pressione ed avvitare la capsula di alluminio.

**DURATA DEL TRATTAMENTO** - In mancanza di risultati apprezzabili dopo breve tempo consultare il medico. È sconsigliato l'impiego ininterrotto per più di 5 giorni.

**SOVRADOSAGGIO** - Non sono noti fenomeni di sovradosaggio.

**EFFETTI INDESIDERATI** - Gli effetti collaterali sistemici sono improbabili a causa delle basse dosi adoperate; la loro comparsa, tuttavia, può essere favorita da trattamenti condotti per periodi di tempo prolungati. Localmente possono manifestarsi talora, senso di bruciore, irritazione.

Particolare cautela deve essere posta nell'uso prolungato tenendo sotto controllo il paziente onde svelare tempestivamente eventuali effetti collaterali sistemici (osteoporosi, ulcera peptica, segni di insufficienza surrenale secondaria, oto - e nefrotossicità).

Nel caso insorgessero effetti indesiderati differenti da quelli riportati rivolgersi al medico o al farmacista.

**VALIDITÀ DEL PREPARATO** - Non utilizzare il preparato oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione: Agosto 2006.