

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### Pupilla light 0,1 mg/ml collirio, soluzione

Benzalconio cloruro

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Pupilla light e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Pupilla light
3. Come usare Pupilla light
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Pupilla light
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Che cos'è Pupilla light e a che cosa serve

Pupilla light è un collirio contenente benzalconio cloruro, un disinfettante (antibatterico). Questo medicinale si usa per disinfettare l'occhio quando è irritato da polvere, fumo o smog.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

#### 2. Cosa deve sapere prima di usare Pupilla light

##### Non usi Pupilla light

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);

##### Avvertenze e precauzioni

Non usi Pupilla Light per trattamenti prolungati; consulti il medico se dopo alcuni giorni di trattamento non nota miglioramenti.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale (topico) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso **interrompa il trattamento** e consulti il medico per iniziare una terapia adatta.

Non usi Pupilla Light se ha problemi alla cornea (infiammazioni, ferrite o abrasioni corneali).

L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta mortali (vedere paragrafo 3 "Se usa più Pupilla light di quanto deve"). **In caso di ingestione accidentale consulti immediatamente un medico o si rivolga al più vicino ospedale.**

Il prodotto è solo per uso esterno e quindi non deve essere ingerito.

Il principio attivo di questo medicinale, benzalconio cloruro, può causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con **lenti a contatto morbide**. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle.

È nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

### **Bambini**

Non usare in bambini al di sotto dei 12 anni, salvo diversa indicazione del medico.

### **Altri medicinali e Pupilla light**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **3. Come usare Pupilla light**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

Non superi le dosi consigliate.

La dose raccomandata è 2 - 3 gocce nell'occhio da instillare 2 o 3 volte al giorno.

### **Istruzioni per l'uso**

Sviti la capsula, capovolga il flaconcino e lo diriga sopra l'occhio: preme con il pollice e l'indice. Si avrà la fuoriuscita delle gocce. Dopo l'uso, riavviti la capsula.

### **Per un uso corretto:**

Durante l'instillazione eviti di toccare gli occhi con la punta del contagocce di questo medicinale.

Non usi questo medicinale mentre indossa le lenti a contatto.

Questo medicinale NON può essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura.

### **Se usa più Pupilla light di quanto deve**

Alle dosi raccomandate e in caso di uso corretto (instillazione nell'occhio), non sono noti sintomi da sovradosaggio.

In caso di ingestione accidentale si possono manifestare nausea e vomito.

Se ha ingerito accidentalmente questo medicinale **avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale** perché può andare incontro a gravi conseguenze.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questo medicinale può causare sensazione di bruciore e irritazione degli occhi (intolleranza). Questi sintomi non devono preoccupare, perché sono privi di conseguenze.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Pupilla light**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

NON usi questo medicinale oltre 30 giorni dopo la prima apertura.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scad.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Pupilla light**

- Il principio attivo è benzalconio cloruro. 1 ml di collirio contiene 0,1 mg di benzalconio cloruro.
- Gli altri componenti sono acqua distillata di: camomilla, issopo, rosa, piantaggine, malva, mirtillo; ipromellosa; soluzione isotonica.

### **Descrizione dell’aspetto di Pupilla light e contenuto della confezione**

Pupilla light 1 mg/ml collirio, soluzione si presenta in un flacone da 10 ml con contagocce.

### **Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio**

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

### **Produttore**

FARMIGEA S.p.A. - Via G.B. Oliva, 8 – 56121 Pisa

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**