

# **ANTIFLOG 1% GEL**

50 g

Piroxicam

## **Composizione.**

100 g di gel contengono: piroxicam g 1.

Eccipienti: carbossivinilpolimero, alcool etilico, polietilenglicole 400, glicerina, alcool benzilico, trietanolamina, essenza di lavanda, acqua depurata.

## **Forma farmaceutica**

50 g di gel per uso topico.

## **Categoria farmacoterapeutica**

Antinfiammatori e antireumatici non steroidei per uso topico -

## **Titolare A.I.C.**

F.I.R.M.A. S.p.A. - Via di Scandicci, 37 - Firenze -

**Produttore:** A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.  
- Via Sette Santi n. 3 - Firenze.

## **Indicazioni terapeutiche**

Affezioni dolorose flogistiche o traumatiche delle articolazioni, delle strutture periarticolari, dei tendini, dei legamenti e dei muscoli.

## **Controindicazioni**

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto.

## **Precauzioni d'uso**

E' opportuno evitare l'applicazione del prodotto in corrispondenza di ferite aperte o lesioni della cute.

In via prudenziale, si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario.

## **Interazioni medicamentose ed altre**

Per quanto noto, è estremamente improbabile che il piroxicam per via topica spiazzati altri farmaci legati alle proteine plasmatiche. Tuttavia, dato l'elevato legame con le proteine plasmatiche, occorre tenere sotto controllo i pazienti trattati contemporaneamente con Antiflog 1% Gel e farmaci con elevato legame proteico, per eventuali aggiustamenti dei dosaggi.

### **Avvertenze**

L'uso specie se prolungato di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione e di irritazione locale. In tal caso è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea (Vedere " interazioni ").

**Effetti sulla guida e sull'uso di macchine:** non è stato finora riportato alcun effetto.

### **Posologia**

Applicare il preparato sulla parte dolorante, due o tre volte al giorno, massaggiando delicatamente per favorire l'assorbimento.

### **Durata del trattamento**

E' in relazione alla natura e alla gravità della patologia.

### **Sovradosaggio**

Non sono stati finora riportati in letteratura casi di iperdosaggio.

### **Effetti indesiderati**

Non sono state evidenziate nè reazioni cutanee o di sensibilizzazione, nè manifestazioni a carattere generale, collegabili con l'applicazione del farmaco. Il basso assorbimento di principio attivo esclude la possibilità di raggiungere livelli ematici tali da provocare gli effetti collaterali legati ad una somministrazione per via sistemica.

In caso di effetti indesiderati, particolarmente se non descritti nel foglio illustrativo, è opportuno consultare il proprio medico curante o il farmacista.

**Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla scatola**

**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**Data ultima revisione : [Aprile 2006](#)**