

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TIROCCULAR 4% collirio, soluzione

Acetilcisteina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico Le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di tempo.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è TIROCCULAR 4% collirio e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima usare TIROCCULAR 4% collirio
3. Come usare TIROCCULAR 4% collirio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TIROCCULAR 4% collirio
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è TIROCCULAR 4% collirio e a cosa serve

TIROCCULAR è indicato per il trattamento dei disturbi dell'occhio causati dalla diminuzione della secrezione lacrimale, con e senza l'alterazione delle mucose di rivestimento dell'occhio, quali: cheratocongiuntivite secca, affezioni della cornea da diminuzione della lacrimazione, cheratopatie a diversa eziologia e ulcere della cornea.

2. Cosa deve sapere prima di usare TIROCCULAR 4% collirio

Non usi TIROCCULAR 4% collirio

se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di usare TIROCCULAR 4% collirio.

E' consigliato di non impiegare lenti a contatto morbide in corso di terapia con TIROCCULAR, perché possono accumulare il conservante contenuto nella soluzione.

Altri medicinali e TIROCCULAR 4% collirio

Non si conoscono effetti d'interazione con altri medicinali nel caso di applicazione diretta sull'occhio.

Informi il medico se sta assumendo, ha recentemente assunto, o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

TIROCLAR 4% collirio con cibi, bevande e alcol

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di usare questo medicinale. Non ci sono prove che sconsiglino l'uso di TIROCLAR durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

TIROCLAR non compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia eviti di usare TIROCLAR se guida un veicolo, o se usa un macchinario.

TIROCLAR 4% collirio, soluzione contiene Benzalconio cloruro, Può causare irritazione agli occhi. Evitare il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle.

E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.



3. Come usare TIROCLAR 4% collirio

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico.

La dose raccomandata è: 1-2 gocce all'interno dell'occhio, sollevando leggermente le palpebre, per volte al giorno, secondo prescrizione medica.

Per somministrare

- rimuovere la ghiera a strappo totale
- rimuovere il tappo in gomma
- togliere dall'involucro l'apposito contagocce, e calzarlo sull'imboccatura del flacone (Fig. 1)
- togliere il tappo del contagocce e somministrare le gocce (Fig. 2).



3-4

Uso nei bambini

Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di TIROCLAR 4% nella popolazione pediatrica

Se prende più TIROCLAR 4% collirio di quanto deve

Non sono previste conseguenze clinicamente significative.

Se dimentica di prendere TIROCLAR 4% collirio

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Sono possibili irritazioni transitorie localizzate e in soggetti molto reattivi fenomeni di sensibilizzazione che richiedono l'interruzione del trattamento.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TIROCCULAR 4% collirio

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Dopo l'apertura della confezione, il collirio può essere utilizzato per un periodo di tempo non superiore a tre settimane. Si raccomanda di richiudere immediatamente il flacone dopo ogni singola applicazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TIROCCULAR 4% collirio

Il principio attivo è acetilcisteina. In 100 ml di soluzione sono disciolti 4 g. Gli altri componenti sono alcool polivinilico, sodio edetato, sodio cloruro, potassio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di TIROCCULAR 4% collirio e contenuto della confezione

Flacone in vetro ambrato contenente 10 ml di soluzione al 4% e contagocce.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia n. 70
00181 ROMA

Produttore

TUBILUX PHARMA S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00040 Pomezia (ROMA)

Per il confezionamento secondario, controllo e rilascio:
A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco