Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
TANTUM VERDE DENTAL 0,5% pasta dentifricia
Benzidamina cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Tantum Verde Dental e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Tantum Verde Dental
3. Come usare Tantum Verde Dental
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Tantum Verde Dental
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cosa è Tantum Verde Dental e a cosa serve
Tantum Verde Dental contiene benzidamina che ha azione antinfiammatoria, analgesica e anestetica (che riduce infiammazione e dolore) ed è usato per il trattamento delle irritazioni della bocca e delle gengive.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Tantum Verde Dental
Non usi Tantum Verde Dental
- se è allergico alla benzidamina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Tantum Verde Dental.
Le lesioni della bocca possono essere segno di malattie più gravi. Nel caso in cui i sintomi persistono per più di tre giorni si rivolga al medico.
Informi il medico:

Documento reso disponibile da AIFA il 27/04/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

- se è allergico all'acido acetilsalicilico o ad altri medicinali antinfiammatori;
- se soffre o ha sofferto in passato di asma bronchiale (restringimento e infiammazione dei bronchi).

L'uso di Tantum Verde Dental, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione (acquisizione di una maggiore sensibilità).

Altri medicinali e Tantum Verde Dental

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state osservate interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Non sono disponibili dati per il rischio in gravidanza e durante l'allattamento con latte materno.

Tantum Verde Dental può essere utilizzato durante la gravidanza solo in caso di effettiva necessità e con supervisione di un medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

L'uso di Tantum Verde Dental **non** altera la capacità di guida né l'utilizzo di macchinari.

Tantum Verde Dental contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato

Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Tantum Verde Dental contiene l'aroma menta

L'aroma menta contiene alcol di anice, alcol benzilico, cinnamal, alcol cinnamilico, citronellolo, D-Limonene, eugenolo, farnesolo, geraniolo, isoeugenolo, linalolo che possono causare reazioni allergiche.

3. Come usare Tantum Verde Dental

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Modalità di utilizzo:

- stenda il Tantum Verde Dental sullo spazzolino,
- massaggi accuratamente le gengive ed i denti,
- sciacqui la bocca mantenendo il dentifricio in bocca.

Documento reso disponibile da AIFA il 27/04/2023

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

Ripeta le applicazioni 3 volte al giorno dopo i pasti.
Attenzione: non superi le dosi raccomandate.
Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento delle sue caratteristiche.

Se usa più Tantum Verde Dental di quanto deve
Se usa una quantità eccessiva di Tantum Verde Dental o ne ingerisce accidentalmente quantità elevate, consulti immediatamente il medico o il farmacista.
In caso di eccessiva ingestione possono insorgere nausea, vomito, dolore addominale, irritazione dell'esofago (canale alimentare che dalla gola arriva allo stomaco), capogiro, allucinazioni (percezione di cose inesistenti nella realtà), agitazione, ansia e irritabilità.
Sono stati riportati sintomi di sovradosaggio nei bambini, quali eccitazione (stato mentale alterato), convulsioni (movimenti involontari, bruschi ed incontrollati), sudorazione, atassia (perdita della coordinazione muscolare), tremore e vomito.
In caso di sovradosaggio informi il suo medico che deciderà come intervenire per gestire o ridurre i sintomi.

Se interrompe il trattamento con Tantum Verde Dental
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al dentista o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Con l'uso di Tantum Verde Dental possono insorgerei seguenti effetti indesiderati:
Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):
- fotosensibilità (sensibilità alla luce solare o lampade UV)

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000):
- reazioni di ipersensibilità (reazione allergiche)
- bruciore e secchezza della bocca.

Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):
- laringospasmo (restringimento della laringe che provoca difficoltà nella respirazione)
- angioedema (improvviso gonfiore di viso, labbra, bocca, lingua o gola che possono causare difficoltà a respirare e a deglutire). Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
- shock anafilattico (grave reazione allergica), i cui segni possono includere difficoltà respiratoria, dolore toracico o costrizione toracica e/o vertigini/svenimenti, forte prurito della pelle o noduli in rilievo sulla pelle, gonfiore

Documento reso disponibile da AIFA il 27/04/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola e che può essere potenzialmente pericoloso per la vita.
Se durante il trattamento con Tantum Verde Dental manifesta uno degli effetti indesiderati sopra elencati, INTERROMPA il trattamento e si rivolga immediatamente al medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse .
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Tantum Verde Dental

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Tantum Verde Dental

- il principio attivo è benzidamina cloridrato;
- gli altri componenti sono: Calcio fosfato dibasico diidrato; Glicerolo; Carmellosa sodica; Sodio laurilsolfato; Silice colloidale anidra; Saccarina sodica; **Metile para-idrossibenzoato; Propile para-idrossibenzoato**; **Aroma menta**; Giallo chinolina (E 104); Blu patent V (E131) Acqua depurata

Descrizione dell'aspetto di Tantum Verde Dental e contenuto della confezione

Pasta dentifricia per uso dentale in tubo da 75 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia 70, 00181 Roma

Produttore

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

Documento reso disponibile da AIFA il 27/04/2023
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 27/04/2023

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).