

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TWICE 10 mg, capsule rigide a rilascio prolungato
TWICE 30 mg, capsule rigide a rilascio prolungato
TWICE 60 mg, capsule rigide a rilascio prolungato
TWICE 100 mg, capsule rigide a rilascio prolungato
Morfina solfato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è TWICE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere TWICE
3. Come prendere TWICE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TWICE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è TWICE e a cosa serve

TWICE contiene il principio attivo morfina solfato, appartenente al gruppo degli analgesici oppioidi, farmaci che agiscono sul sistema nervoso e che sono usati contro il dolore moderato o forte, associato ad esempio a tumori.

TWICE si usa negli adulti, per controllare il dolore forte e di lunga durata che non risponde più ad altri antidolorifici, in particolare se associato ad un tumore.

2. Cosa deve sapere prima di prendere TWICE

Non prenda TWICE se:

- è allergico alla morfina o ad altri principi attivi derivati dalla morfina (esempio codeina, ossicodone) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- è in gravidanza o sta allattando con latte materno, salvo diversa indicazione del medico (vedere "Gravidanza e allattamento");
- ha impossibilità ad evacuare, dolore, gonfiore e rigidità della pancia (addome acuto con ileo paralitico);
- ha sintomi come sonnolenza o difficoltà nella coordinazione, visione offuscata, difficoltà di parola, perdita di contatto con la realtà, segni di depressione del sistema nervoso centrale (anche causati da farmaci come ad esempio ipnotici, sedativi, tranquillanti);
- ha fatto uso di forti dosi di alcool (alcoolismo acuto) o soffre di sintomi di astinenza da alcool (delirium tremens);
- ha avuto un trauma alla testa (cranico) o ha una malattia che causa un aumento della pressione nel cranio (ipertensione endocranica);
- soffre di convulsioni;
- ha gravi difficoltà a respirare (insufficienza respiratoria o attacco d'asma in corso);
- ha problemi al cuore (scompenso cardiaco) dovuti a malattie croniche ai polmoni;
- ha gravi problemi al fegato o ha di recente subito interventi chirurgici alle vie biliari;
- sta assumendo farmaci chiamati inibitori delle monoaminoossidasi (IMAO), usati contro la depressione;

Avvertenze e precauzioni

Informi il medico se:

- è anziano o si sente molto debole (debilitato);
- ha malattie al cervello (affezioni organiche cerebrali);
- ha problemi respiratori (depressione respiratoria);
- ha malattie croniche ai polmoni, soprattutto se si accompagnano ad una aumentata produzione di muco, o condizioni che causano difficoltà a respirare (patologie ostruttive, cifoscoliosi o obesità);
- ha problemi alla tiroide (mixedema o ipertiroidismo);
- ha un'insufficienza di una ghiandola chiamata surrene (insufficienza adrenocorticale);
- ha un abbassamento grave della pressione del sangue (stati ipotensivi gravi e shock);
- ha dolore all'addome soprattutto dopo i pasti, dovuto a problemi alla colecisti (coliche biliari);
- ha subito un intervento ai dotti biliari o alle vie urinarie;
- ha un aumento del volume della prostata (ipertrofia prostatica);
- evacua poco, ha dolore e gonfiore all'addome, segni di rallentamento del transito intestinale;
- ha malattie dell'intestino (sia di tipo infiammatorio che ostruttivo);
- soffre di problemi al fegato o ai reni.

FACCIA ATTENZIONE, durante la terapia con la morfina è possibile che si verifichi una riduzione nel tempo dell'efficacia e della durata dell'effetto antidolorifico con conseguente necessità di aumentare il dosaggio per poter avere sollievo dal dolore (tolleranza). In tale situazione, se si interrompe la somministrazione di morfina, possono verificarsi sintomi dovuti a sindrome da astinenza quali ad esempio aumento della sensibilità al dolore, diarrea, dilatazione del diametro della pupilla (midriasi), aumento della pressione (ipertensione), brividi di freddo.

Inoltre, è possibile che si sviluppi una condizione di forte bisogno di assumere il farmaco (dipendenza).

Per tali rischi, TWICE deve essere utilizzato sotto stretto controllo medico e solo quando altri farmaci contro il dolore non fanno più effetto.

La tolleranza e i sintomi di astinenza diminuiscono e scompaiono in pochi giorni dopo l'interruzione del trattamento.

Bambini e adolescenti

Non usare TWICE nei bambini e negli adolescenti.

Altri medicinali e TWICE

Informi il medico se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo è particolarmente importante se sta assumendo:

- farmaci che agiscono sul sistema nervoso, come anestetici, ipnotici, sedativi, ansiolitici, neurolettici, antidepressivi triciclici, antistaminici;
- farmaci che aumentano la quantità di urina prodotta giornalmente (diuretici);
- farmaci che rilassano i muscoli (miorilassanti) e dei farmaci che agiscono sui nervi (agenti di blocco neuromuscolare).

TWICE con alcool

Non assuma alcool durante la terapia con TWICE, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio che si presentino alcuni effetti indesiderati o peggiorarne la gravità.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

La sicurezza di TWICE somministrato a donne in gravidanza non è stata accertata, pertanto il suo medico prima di prescrivere questo medicinale avrà valutato attentamente se il beneficio dovuto all'assunzione di TWICE supera il rischio per il nascituro. Prenda questo medicinale sotto stretto controllo medico.

I neonati nati da madri che hanno utilizzato farmaci analgesici oppioidi come TWICE, possono avere effetti indesiderati quali ad esempio gravi disturbi della respirazione o sintomi da astinenza come aumento della sensibilità al dolore, diarrea, dilatazione del diametro della pupilla (midriasi), aumento della pressione (ipertensione), brividi di freddo. Se suo figlio mostra uno di questi sintomi, vada immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino.

Allattamento

Questo medicinale viene escreto nel latte materno. Pertanto se sta allattando, parli con il medico che valuterà se sia il caso di interrompere l'allattamento con latte materno e continuare ad assumere TWICE o, viceversa, proseguire l'allattamento evitando la somministrazione del medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

TWICE altera la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari; poiché la morfina contenuta in TWICE causa sedazione, sonnolenza e rallenta i riflessi.

Eccipienti con effetti noti

TWICE contiene saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

TWICE 60 mg contiene: giallo arancio S E 110. Può causare reazioni allergiche.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

3. Come usare TWICE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico che, in base alla gravità dei suoi sintomi ed al tipo di malattia, stabilirà la dose corretta e la durata del trattamento. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 capsula, 2 due volte al giorno (1 capsula ogni 12 ore).

In caso di dolori persistenti o se compare tolleranza al medicinale, il medico potrà prescriberle una dose maggiore di quella sopra indicata.

Pazienti già in trattamento con altri medicinali contenenti morfina

- Se era in trattamento con compresse di morfina a rilascio immediato e sta passando alla terapia con TWICE (capsule rigide di morfina a rilascio prolungato), il medico le prescriverà lo stesso dosaggio giornaliero, suddividendolo in due somministrazioni (1 ogni 12 ore).
- Se era in trattamento con iniezioni di morfina e sta passando alla terapia con TWICE (capsule rigide di morfina a rilascio prolungato), il medico le prescriverà una dose giornaliera più alta di quella usata per le iniezioni, suddividendolo in due somministrazioni (1 ogni 12 ore).

Bambini e adolescenti

Non usare TWICE nei bambini e negli adolescenti.

Modo di somministrazione

Assuma TWICE per bocca (via orale); deglutisca le capsule intere con un po' d'acqua, senza masticarle.

Attenda sempre un intervallo di 12 ore tra una dose e la successiva.

Per i pazienti con difficoltà di deglutizione e che si trovano in ambiente ospedaliero, è possibile

somministrare il contenuto delle capsule tramite sonda gastrica.

Se prende più TWICE di quanto deve potrebbe notare sintomi come diminuzione del diametro della pupilla (miosi), abbassamento della temperatura del corpo (ipotermia), flaccidità dei muscoli, gravi problemi respiratori, di circolazione del sangue e/o della coscienza, incluso il coma.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di TWICE vada immediatamente al più vicino ospedale, poiché potrebbero essere necessarie misure adeguate.

Se dimentica di prendere TWICE

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con TWICE

Non interrompa bruscamente il trattamento con TWICE poiché ciò potrebbe causarle sintomi di astinenza, soprattutto se prende questo medicinale da molto tempo. Se è necessaria un'interruzione della terapia, il medico le indicherà come e quando sospendere il trattamento, riducendo gradualmente la dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi il medico se durante il trattamento con TWICE nota:

- difficoltà a respirare o arresto del respiro (depressione respiratoria, atelectasia parziale e cioè riduzione parziale del volume polmonare, arresto respiratorio);
- pressione del sangue bassa e problemi con il cuore (depressione circolatoria);
- diminuzione del diametro della pupilla (miosi), o visione anormale;
- mal di testa (che può essere dovuto anche a pressione aumentata nel cranio), sedazione, mente offuscata (ottundimento mentale), sincope;
- vertigini;
- eccitazione, difficoltà a dormire (insonnia), agitazione, eccessiva felicità (euforia), alterazione dell'umore (disforia, depressione dell'umore) indifferenza, sindrome da astinenza (vedere Avvertenze e Precauzioni);
- irritabilità, stanchezza (astenia);
- alterazioni di alcuni esami diagnostici (pressione interna aumentata nelle vie biliari, corticotropina ematica diminuita, glucocorticoidi ridotti, ormone luteinizzante diminuito, ormone follicolo-stimolante diminuito, testosterone diminuito, ormone antidiuretico aumentato, prolattina aumentata, acidità gastrica diminuita, corticotropina anormale);
- dilatazione dei vasi periferici (vasodilatazione periferica), senso di svenimento quando passa dalla posizione sdraiata o seduta a quella in piedi (ipotensione ortostatica), diminuzione improvvisa della pressione del sangue (collasso cardiovascolare);
- nausea, conati di vomito, difficoltà ad evacuare (costipazione), fastidio alla bocca dello stomaco (epigastrico), disturbo dei movimenti dell'intestino;
- dolore acuto alla parte superiore della pancia (colica biliare, spasmo dello sfintere di Oddi);
- arrossamento del viso, arrossamento generalizzato, sudorazione, prurito, orticaria, lesioni o macchie della pelle (eruzione cutanea);
- diminuzione nella quantità di urina prodotta giornalmente (oliguria), difficoltà di svuotamento della vescica.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "<http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TWICE

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TWICE

Il principio attivo è morfina solfato.

TWICE 10 mg

Ogni capsula da 10 mg contiene: 10 mg di morfina solfato pari a 3,76 mg morfina.

Gli altri componenti sono: microgranuli di saccarosio e amido di mais; macrogol 4000, aquacoat ECD 30, dibutilsebacato, talco, gelatina, giallo chinolina E 104, biossido di titanio E 171, ossido di ferro nero.

TWICE 30 mg

Ogni capsula da 30 mg contiene: 30 mg di morfina solfato pari a 11,28 mg morfina.

Gli altri componenti sono: microgranuli di saccarosio e amido di mais, macrogol 4000, aquacoat ECD 30, dibutilsebacato, talco, gelatina, biossido di titanio E 171, eritrosina E 127, ossido di ferro nero.

TWICE 60 mg

Ogni capsula da 60 mg contiene: 60 mg morfina solfato pari a 22,56 mg morfina.

Gli altri componenti sono: microgranuli di saccarosio e amido di mais, macrogol 4000, aquacoat ECD 30, dibutilsebacato, talco, gelatina, biossido di titanio E 171, giallo arancio S E 110, ossido di ferro nero.

TWICE 100 mg

Ogni capsula da 100 mg contiene: 100 mg morfina solfato pari a 37,59 mg morfina.

Gli altri componenti sono: microgranuli di saccarosio e amido di mais, macrogol 4000, aquacoat ECD 30, dibutilsebacato, talco, gelatina, biossido di titanio E 171, ossido di ferro nero.

Descrizione dell'aspetto di TWICE e contenuto della confezione

TWICE 10 mg è disponibile in confezioni da 16 capsule rigide a rilascio prolungato.

TWICE 30 mg è disponibile in confezioni da 16 capsule rigide a rilascio prolungato.

TWICE 60 mg è disponibile in confezioni da 16 capsule rigide a rilascio prolungato.

TWICE 100 mg è disponibile in confezioni da 16 capsule rigide a rilascio prolungato.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia 70 - 00181 ROMA

Produttore

Ethypharm – Chemin de la Poudrière – 76120 Grand-Quevilly (Francia).

ACRAF SpA – Via Vecchia del Pinocchio, 22 – 60131 Ancona (Italia).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il