

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Tobramicina Angelini 0,3% collirio, soluzione

Tobramicina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perchè potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio
3. Come usare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio e a cosa serve

Questo medicinale è indicato per il trattamento delle infezioni dell'occhio e strutture annesse, causate da batteri sensibili alla tobramicina; ad esempio: congiuntivite catarrale acuta, subacuta e cronica; infezioni del margine palpebrale, della cornea, del sacco lacrimale. Questo medicinale si usa anche per la profilassi pre e post-operatoria negli interventi che riguardano la parte più esterna dell'occhio.

2. Cosa deve sapere prima di usare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

Non usi TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

- se è allergico al principio attivo, a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è in gravidanza o sta allattando al seno (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio.

Non superi le dosi o il periodo di terapia prescritti dal medico.

Come per tutti gli antibiotici, l'uso prolungato può favorire la crescita di microrganismi resistenti, inclusi i funghi. Nel caso in cui la somministrazione di tobramicina collirio avvenga insieme ad un altro antibiotico aminoglicosidico, stessa categoria della tobramicina, deve essere messa sotto controllo la concentrazione degli antibiotici nel sangue.

Bambini

Il medicinale è sicuro nell'uso pediatrico, ma, nella prima infanzia il prodotto va, comunque, somministrato nei casi di effettiva necessità.

Altri medicinali e TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

Informi il medico se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Il componente tyloxapol è incompatibile con la tetraciclina.

TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio con cibi e alcol

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento

Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto non deve essere somministrato.

Il prodotto non deve essere usato durante l'allattamento. Se il medico ritenesse il trattamento necessario, l'allattamento dovrà essere sospeso.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio, soluzione non compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio contiene benzalconio cloruro

TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio contiene benzalconio cloruro che può causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

3. Come usare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico. La dose raccomandata è: due gocce, quattro volte al giorno nelle forme acute, e tre volte al giorno nelle forme croniche, secondo prescrizione medica.

Instillare nell'occhio.

Se prende più TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio di quanto deve

Consulti il medico.

Se dimentica di prendere TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

La tobramicina è un antibiotico aminoglicosidico. Questo tipo di antibiotico nell'uso oculare, può causare reazioni d'intolleranza o d'ipersensibilità locale quali prurito, gonfiore delle palpebre o arrossamento della congiuntiva. Questi fenomeni di norma si rilevano in meno del 3% dei pazienti trattati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio

- Il principio attivo è tobramicina.
- Gli altri componenti sono: tyloxapol, acido bórico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di TOBRAMICINA ANGELINI 0,3% collirio e contenuto della confezione

Flacone da 5 ml, in polietilene bianco a bassa densità, con contagocce, sigillato con una capsula in polipropilene.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA

Produttore
Bruschettini S.r.l. Via Isonzo, 6 - 16147 Genova

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il mese di