Benzidamina Angelini 0,5% crema vaginale

Benzidamina cloridrato

CATEGORIA FARMACO TERAPEUTICA
Antinfiammatorio non steroideo per uso vaginale.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Vaginiti di tipo aspecifico (traumatiche, da flora mista, da Gardnerella vaginalis e da radioterapia, vaginiti in menopausa e vaginiti senili).
Profilassi pre- e post-operatoria in chirurgia ginecologica.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO
L'uso, specie se prolungato, dei prodotti topici potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione, nel qual caso occorre sospendere il trattamento ed adottare le idonee misure terapeutiche.
.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Non sono state osservate interazioni con altri farmaci di comune impiego nella terapia pertinente.

AVVERTENZE SPECIALI
Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Non esistono controindicazioni all'uso topico della benzidamina in gravidanza o durante l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso dei macchinari
Benzidamina Angelini non altera la capacità di guidare e di usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti: contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
1-2 applicazioni al giorno, secondo il parere del medico.

SOVRADOSAGGIONon sono stati riportati casi di sovradosaggio
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Benzidamina Angelini avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI BENZIDAMINA ANGELINI, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, Benzidamina Angelini può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Occasionalmente, specialmente con l'uso prolungato del medicinale, possono manifestarsi irritazioni cutanee.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APPLICATORE



1. Avvitare l'applicatore sul tubo al posto del tappo;

2. Premere leggermente il tubo alla sua estremitàinferiore per far penetrare la crema nell'applicatore.
Se il pistone offre una certa resistenza, tirarlo delicatamente. Salvo prescrizione del medico curante,l'applicatore dovrà essere riempito completamente.

3. Togliere l'applicatore dal tubo, che deve essere immediatamente richiuso col tappo.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4. In posizione distesa, le ginocchia sollevate eallargate, introdurre delicatamente l'applicatore invagina il più profondamente possibile. Spingere completamente il pistone. Ritirare quindi l'applicatore senza toccare il pistone e gettarlo.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

COMPOSIZIONE
100 g di crema contengono:
Principio attivo: benzidamina cloridrato mg 500.
Eccipienti:glicole propilenico, trigliceridi neutri saturi, cetomacrogol 1000, idrossietilcellulosa, sodio citrato biidrato, acido citrico monoidrato, acido benzoico, acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Crema vaginale. Tubo da 30 g con 6 applicatori monouso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

PRODUTTORE
A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: 5/10/2012

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).