

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### SINARTROL INFIAMMAZIONE E DOLORE 1,5 % Crema

Cinnoxicam (piroxicam cinnamato)

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Sinartrol Infiammazione e Dolore e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Sinartrol Infiammazione e Dolore
3. Come usare Sinartrol Infiammazione e Dolore
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Sinartrol Infiammazione e Dolore
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Sinartrol Infiammazione e Dolore e a cosa serve**

Sinartrol Infiammazione e Dolore contiene il principio attivo cinnoxicam (piroxicam cinnamato) che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antinfiammatori non steroidei, utilizzati localmente (uso topico) per i dolori ai muscoli ed alle articolazioni.

Sinartrol Infiammazione e Dolore è indicato per i dolori di diversa natura (infiammatoria, degenerativa, traumatica) che colpiscono le articolazioni ed i muscoli.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o si sente peggio.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Sinartrol Infiammazione e Dolore**

##### **Non usi Sinartrol Infiammazione e Dolore**

- se è allergico al cinnoxicam (piroxicam cinnamato) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Sinartrol Infiammazione e Dolore.

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (aumentata reattività). In tale evenienza, interrompa il trattamento e consulti il medico per istituire un'adeguata terapia.

##### **Altri medicinali e Sinartrol Infiammazione e Dolore**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni tra Sinartrol Infiammazione e Dolore ed altri medicinali.

##### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno usi Sinartrol Infiammazione e Dolore solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Sinartrol Infiammazione e Dolore non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **Sinartrol Infiammazione e Dolore contiene glicole propilenico, alcool cetilstearylco e paraidrossibenzoati**

Questo medicinale contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea, alcool cetilstearylco che può causare reazioni cutanee locali (ad esempio dermatiti da contatto) e paraidrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **3. Come usare Sinartrol Infiammazione e Dolore**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Spalmi un'opportuna quantità di crema sulla parte dolorante, massaggiando leggermente fino al completo assorbimento. Ripeta l'operazione 2 o 3 volte al giorno.

### **Se usa più Sinartrol Infiammazione e Dolore di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di Sinartrol Infiammazione e Dolore, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sinartrol Infiammazione e Dolore è generalmente ben tollerato. In rari casi possono verificarsi reazioni di sensibilizzazione od irritazione locale, soprattutto nel caso in cui abbia usato per un periodo prolungato questo medicinale. In tal caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico che le indicherà una terapia adeguata.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Sinartrol Infiammazione e Dolore**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Sinartrol Infiammazione e Dolore**

- Il principio attivo è cinnoxicam (piroxicam cinnamato). 1 g di crema contiene 15 mg di cinnoxicam (piroxicam cinnamato).
- Gli altri componenti sono: paraffina liquida, alcool cetilstearylco, poliossietilen-cetilstearylco, glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acido citrico, sodio citrato, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Sinartrol Infiammazione e Dolore e contenuto della confezione**

Sinartrol Infiammazione e Dolore è una crema contenuta in un tubo da 50 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A. - Via Biella, 8 - 20143 Milano - Italia.

### **Produttore**

DOPPEL Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco