

**GOLADIN**  
Dequalinio Cloruro

**COMPOSIZIONE**

Ogni pastiglia da 2.95g contiene:

Principio attivo:

Dequalinio cloruro (decametilen bis-4-aminochinaldina cloruro) 0.00025 g

Eccipienti:

Saccarosio, Glucosio, Eucaliptolo, Mentolo

**FORMA FARMACEUTICA**

“0,25 mg pastiglie” 24 pastiglie.

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Disinfettante per uso orale locale.

**TITOLARE A.I.C.**

SOFAR S.p.A., via Firenze 40, Trezzano Rosa (MI)

**STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DI CONTROLLO**

SOFAR S.p.A., Via Firenze 40 - Trezzano Rosa (MI)

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Disinfezione della mucosa orale.

**INFORMAZIONI DA CONOSCERE PRIMA DELL'USO**

**Controindicazioni**

Soggetti con ipersensibilità verso i componenti del prodotto. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 12 anni, salvo diversa prescrizione medica.

**Precauzioni d'impiego**

Il prodotto è solo per uso locale. L'uso specie se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento

e consultare il medico per istituire una idonea terapia. Il prodotto contiene zucchero, di ciò si tenga conto in pazienti diabetici o che seguono regimi dietetici ipocalorici. Durante la gravidanza e l'allattamento utilizzare dietro controllo medico.

## **INTERAZIONI**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

### **Avvertenze Speciali**

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi. Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

## **ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO**

### **Dose, modo e tempo di somministrazione**

Sciogliere lentamente in bocca una pastiglia di Goladin ogni due ore. Non superare le dosi consigliate con un massimo di 8 pastiglie al giorno.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) peraltro priva di conseguenza, che non richiede modifica del trattamento. Comunicare al proprio Medico o Farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

**ATTENZIONE: Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.**

## **ULTIMA REVISIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Aprile 2011