

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

PLACENTEX 0,08 % crema  
Polidesossiribonucleotide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX
3. Come usare PLACENTEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PLACENTEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve**

PLACENTEX è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, con attività cicatrizzante (accelera il processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

PLACENTEX crema è indicato per il trattamento di ferite superficiali di piccole dimensioni e ulcerazioni di lieve entità.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX**

##### **Non usi PLACENTEX**

- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. La soluzione è solo per uso esterno. Il prodotto è solo per uso esterno.

In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario, instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

##### **Altri medicinali e PLACENTEX**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

##### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

##### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**PLACENTEX 0,08 % Crema contiene lanolina, alcool cetilstearylco, alchil para-idrossibenzoati e una base aromatica**

Documento reso disponibile da AIFA il 12/01/2023

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Questo medicinale contiene lanolina ed alcool cetilstearyllico. Possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto).

Questo medicinale contiene alchil para-idrossibenzoati. Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Questo medicinale contiene una base aromatica, a sua volta contenente citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo. Citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo possono causare reazioni allergiche.

### 3. Come usare PLACENTEX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi il prodotto localmente 1 o 2 volte al giorno o secondo prescrizione medica.

Uso cutaneo.

#### Se usa più PLACENTEX di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/applicazione accidentale di una dose eccessiva di PLACENTEX avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

#### Se dimentica di usare PLACENTEX

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni").

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. Come conservare PLACENTEX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### Cosa contiene PLACENTEX 0,08% crema

— Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. 100 g di crema contengono 80 mg di polidesossiribonucleotide. Gli altri componenti sono: esteri di acido oleico dell'alcol decilico, alcool cetilstearyllico, lanolina anidra, alchil para-idrossibenzoati, imidazolidinilurea, base aromatica (contiene citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo), acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione**

PLACENTEX 0,08% crema - tubo da 25 g.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Mastelli S.r.l.

Via Bussana Vecchia n° 32

18038 Sanremo (IM)

Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

PLACENTEX 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea  
Polidesossiribonucleotide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX
3. Come usare PLACENTEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PLACENTEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, con attività cicatrizzante (accelera il processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti). PLACENTEX soluzione cutanea è indicato per il trattamento di ferite e ulcere cutanee.

#### 2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

##### Non usi PLACENTEX

- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX.

Il prodotto è solo per uso esterno.

In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario, instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

##### Altri medicinali e PLACENTEX

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

##### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

##### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

#### 3. Come usare PLACENTEX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi il prodotto localmente 1 o 2 volte al giorno, con garze sterili bagnate con la soluzione o secondo prescrizione medica.

Uso cutaneo.

#### **Se usa più PLACENTEX di quanto deve**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/applicazione accidentale di una dose eccessiva di PLACENTEX avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare PLACENTEX**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni").

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare PLACENTEX**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene PLACENTEX 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea**

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 0,75 mg di polidesossiribonucleotide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili

##### **Descrizione dell'aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione**

PLACENTEX 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea- 10 fiale da 3 ml.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Mastelli S.r.l.

Via Bussana Vecchia n° 32

18038 Sanremo (IM)

Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile

PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile

Polidesossiribonucleotide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX
3. Come usare PLACENTEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PLACENTEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve**

PLACENTEX è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, con attività cicatrizzante (accelera il processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX**

**Non usi PLACENTEX**

- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX.

In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario, instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

**Altri medicinali e PLACENTEX**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

**Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile e PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile contengono sodio.**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per dose, cioè essenzialmente "senza sodio".

### 3. Come usare PLACENTEX

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Una fiala al dì per via intramuscolare o sottocutanea, per cicli di 15-20 giorni, ripetibili o secondo prescrizione medica.

#### **Se usa più PLACENTEX di quanto deve**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/somministrazione accidentale di una dose eccessiva di PLACENTEX avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare PLACENTEX**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con PLACENTEX**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni").

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. Come conservare PLACENTEX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **Cosa contiene PLACENTEX**

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 5,625 mg di polidesossiribonucleotide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili
  
- PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile
- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Ogni fiala da 3 ml contiene 2,25 mg di polidesossiribonucleotide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili

**Descrizione dell'aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione**

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 3 ml

PLACENTEX 2,25 mg/ 3ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 3 ml

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Mastelli S.r.l.

Via Bussana Vecchia n° 32

18038 Sanremo (IM)

Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco



## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione  
Polidesossiribonucleotide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX
3. Come usare PLACENTEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PLACENTEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, con attività cicatrizzante (accelera il processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

PLACENTEX collirio è indicato per il trattamento di malattie dell'occhio quali lesioni della cornea e della congiuntiva (piccole ferite, microtraumi, lesioni da lenti a contatto).

#### 2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

##### Non usi PLACENTEX

- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX.

In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario, instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

##### Altri medicinali e PLACENTEX

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

##### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

##### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione contiene metile para-idrossibenzoato (E218) ed propile para-idrossibenzoato (E216)**

Questo medicinale contiene metile para-idrossibenzoato (E218) ed propile para-idrossibenzoato (E216). Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

### **3. Come usare PLACENTEX**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Premere delicatamente sul corpo del cappuccio e far cadere 2 o 3 gocce di collirio nello spazio tra l'occhio e la palpebra (fornice congiuntivale) 2-4 volte al giorno o secondo prescrizione medica.

#### **Se usa più PLACENTEX di quanto deve**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/applicazione accidentale di una dose eccessiva di PLACENTEX avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare PLACENTEX**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni").

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare PLACENTEX**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene PLACENTEX**

- PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione
- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. Il flacone da 10 ml contiene 7,5 mg di polidesossiribonucleotide.

- Gli altri componenti sono: polivinilpirrolidone, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, sodio edetato, metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili

**Descrizione dell'aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione**

PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione, flacone contagocce da 10 ml

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Mastelli S.r.l.

Via Bussana Vecchia n° 32

18038 Sanremo (IM)

Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco