

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di **AUTOMEDICAZIONE** che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

LACRILUBE 42,5% paraffina liquida + 57,3% vaselina bianca unguento oftalmico

COMPOSIZIONE

100 g contengono:

Principi attivi: Paraffina liquida, Vaselina bianca

Eccipienti: Lanolina alcool

COME SI PRESENTA

Lacrilube si presenta in forma di un unguento omogeneo e liscio, di colore bianco.

Ogni tubo contiene 3,5 g di unguento oftalmico.

CHE COSA È

Lubrificante oculare.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE

ALLERGAN S.P.A.

Via Salvatore Quasimodo, 134/138

Roma

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

TUBILUX PHARMA S.p.A

Via Costarica, 20/22

Pomezia (Roma)

PERCHÉ SI USA

Lacrilube si usa per lubrificare e proteggere gli occhi in presenza di stati di secchezza oculare.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso gli alcol della lanolina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Quando può essere usato dopo aver consultato il medico

Il prodotto è solo per uso esterno; l'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Lacrilube contiene ingredienti che sono stati utilizzati da anni in altri medicinali senza effetti preoccupanti in gravidanza o allattamento. Pertanto, nessuna speciale precauzione è necessaria per l'utilizzo di Lacrilube in queste condizioni.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Il medicinale può causare offuscamento della vista e temporanei disturbi visivi in alcuni pazienti. Non guidate e non usate macchinari fino a quando i sintomi non sono scomparsi.

PRECAUZIONI PER L'USO

Poichè Lacrilube è una preparazione sterile, evitare che la punta del tubo venga a contatto con qualsiasi superficie.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Non sono state osservate interazioni con altri medicinali.

Se state usando altri medicinali (anche quelli senza prescrizione medica) chiedete consiglio al vostro medico o farmacista. Se state utilizzando (o avete intenzione di usare) altre medicazioni per trattare una condizione oculare, allora dovete prima applicare l'altra medicazione e poi aspettare almeno 5 minuti prima di usare Lacrilube.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il medicinale deve essere tenuto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Se portate lenti a contatto, queste devono essere rimosse prima dell'utilizzo del prodotto. Le lenti possono essere nuovamente indossate dopo 30 minuti dall'applicazione dell'unguento.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Lacrilube

Lacrilube contiene lanolina alcol che può causare reazioni locali (es. dermatite da contatto).

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Usare Lacrilube seguendo esattamente le istruzioni contenute in questo foglio illustrativo. In caso di dubbio contattare il medico o il farmacista.

Quanto

Applicare una piccola quantità di Lacrilube nell'occhio una o più volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.

Il sovradosaggio accidentale (negli occhi) non rappresenta un pericolo, a parte l'offuscamento della vista per breve tempo. Se Lacrilube è deglutito per errore, contattate il medico o il farmacista.

Non applicare dosi doppie di prodotto se è stata dimenticata l'applicazione di una dose individuale. Applicare direttamente la dose successiva nel momento necessario come consigliato dal medico o dal farmacista.

Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Questo prodotto non deve essere usato per un periodo superiore a 72 ore.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

In caso di comparsa o peggioramento di irritazione, dolore, rossore o cambiamenti della visione, interrompete il trattamento con Lacrilube e consultate il medico o il farmacista.

Come

- Lavare le mani
- Abbassare la palpebra inferiore in modo da formare una piccola sacca in cui applicare il prodotto
- Tenere leggermente la testa indietro
- Tenere il tubo del prodotto tra pollice ed indice ed applicarne una piccola quantità nella sacca precedentemente formata
- Chiudere gli occhi, ruotandoli da destra a sinistra e viceversa per favorire la distribuzione del prodotto.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Lacrilube può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dopo applicazione di Lacrilube, si possono verificare i seguenti effetti indesiderati, ma la frequenza non è nota:

- Irritazione oculare
- Rossore oculare
- Dolore oculare
- Offuscamento della vista
- Allergia oculare
- Gonfiore e prurito dell'occhio e/o della palpebra
- Escrezione oculare
- Sensazione di corpo estraneo nell'occhio
- Eccesso di lacrimazione

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Dopo la prima apertura la validità è di 28 giorni.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale. Pertanto, conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il