

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### **BAMIFIX 600 mg compresse rivestite** Bamifillina cloridrato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Bamifix e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix
3. Come prendere Bamifix
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Bamifix
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Bamifix e a cosa serve**

Bamifix contiene bamifillina cloridrato, un principio attivo appartenente al gruppo dei derivati xantinici (broncodilatatori), che rilassa i muscoli delle pareti delle piccole vie aeree dei polmoni.

Bamifix è indicato per prevenire le difficoltà respiratorie in caso di asma e altre patologie dei polmoni che comportano un restringimento dei bronchi.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix**

##### **Non prenda Bamifix se:**

- è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ha avuto allergia dopo l'assunzione di altri farmaci contenenti principi attivi simili (derivati xantinici, ad esempio teofillina);
- ha o ha avuto un attacco di cuore (infarto miocardico acuto).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico prima di prendere Bamifix.

In particolare informi il medico se:

- ha gravi problemi al cuore (insufficienza cardiaca avanzata);
- soffre di pressione molto alta del sangue (grave ipertensione);
- ha problemi (insufficienza) ai reni o al fegato;
- ha un'ulcera dello stomaco (ulcera gastrica);
- ha una funzione aumentata della tiroide (ipertiroidismo).

Informi il medico se è un fumatore, poiché il fumo di sigaretta può influenzare il suo trattamento con Bamifix.

#### **Altri medicinali e Bamifix**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Ciò è particolarmente importante se sta assumendo:

- propanololo, usato principalmente per la pressione alta (ipertensione) e per le malattie del cuore;
- farmaci appartenenti alla stessa classe della bamifillina (derivati xantini, ad esempio teofillina);
- farmaci appartenenti alla classe dei simpaticomimetici, quali ad esempio l'efedrina, che vengono utilizzati nell'asma.

Alcuni farmaci o vaccini che interagiscono con la teofillina (farmaco simile alla bamifillina) potrebbero influenzare il trattamento con Bamifix. Informi il medico se:

- assume antibiotici quali: eritromicina, lincomicina, clindamicina;
- assume farmaci che fluidificano il sangue (anticoagulanti);
- assume allopurinolo, farmaco usato per la gotta;
- assume cimetidina, farmaco usato per trattare le ulcere;
- assume farmaci usati per l'epilessia (esempio fenitoina o altri anticonvulsivanti);
- si è di recente vaccinato o deve vaccinarsi contro l'influenza.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico, prima di prendere Bamifix.

Sebbene non si siano osservati effetti negativi sulla fertilità, sulla gravidanza, sull'allattamento o sullo sviluppo dell'embrione e/o del feto, come misura precauzionale si consiglia di non prendere Bamifix nei primi mesi di gravidanza, negli ultimi giorni di gravidanza e durante l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Bamifix non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

**Bamifix contiene saccarosio.** Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come prendere Bamifix**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa al giorno negli adulti, da assumere per bocca (via orale), al mattino o alla sera prima dei pasti, salvo diversa indicazione del medico.

**Se prende più Bamifix di quanto deve** avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale, poiché è necessario attuare misure adeguate.

Dosi superiori a quelle terapeutiche possono indurre la comparsa di nausea e di fini tremori che scompaiono riducendo la dose.

### **Se dimentica di prendere Bamifix**

Proseguire regolarmente con la terapia. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

### **Se interrompe il trattamento con Bamifix**

Non interrompa il trattamento senza consultare il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si rivolga al medico se durante la terapia con Bamifix nota:

- mal di testa (cefalea);
- dolore allo stomaco (gastralgia), nausea, cattiva digestione (dispepsia);
- reazioni allergiche, che si manifestano con la comparsa più o meno improvvisa di lesioni della pelle come, ad esempio, cambiamenti di colore a macchie o diffusi (eruzioni cutanee), orticaria, prurito, dermatite;
- tremori.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Bamifix**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Bamifix**

Il principio attivo è: bamifillina cloridrato.

Una compressa contiene 600 mg di bamifillina cloridrato.

Gli altri componenti sono: saccarosio, calcio carbonato, idrossipropilmetilcellulosa, metilcellulosa, magnesio stearato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, silice colloidale idrata, alluminio idrossido, cere naturali.

### **Descrizione dell'aspetto di Bamifix e contenuto della confezione**

Questo medicinale è disponibile in astuccio contenente 30 compresse rivestite da 600 mg.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo 26/A – Parma.

### **Produttore**

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Officina di Parma, Via San Leonardo 96.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.**

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### **BAMIFIX 900 mg compresse rivestite** Bamifillina cloridrato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Bamifix e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix
3. Come prendere Bamifix
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Bamifix
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Bamifix e a cosa serve**

Bamifix contiene bamifillina cloridrato, un principio attivo appartenente al gruppo dei derivati xantini (broncodilatatori), che rilassa i muscoli delle pareti delle piccole vie aeree dei polmoni.

Bamifix è indicato per prevenire le difficoltà respiratorie in caso di asma e altre patologie dei polmoni che comportano un restringimento dei bronchi.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix**

##### **Non prenda Bamifix se:**

- è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ha avuto allergia dopo l'assunzione di altri farmaci contenenti principi attivi simili (derivati xantini, ad esempio teofillina);
- ha o ha avuto un attacco di cuore (infarto miocardico acuto).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico prima di prendere Bamifix.

In particolare informi il medico se:

- ha gravi problemi al cuore (insufficienza cardiaca avanzata);
- soffre di pressione molto alta del sangue (grave ipertensione);
- ha problemi (insufficienza) ai reni o al fegato;
- ha un'ulcera dello stomaco (ulcera gastrica);
- ha una funzione aumentata della tiroide (ipertiroidismo).

Informi il medico se è un fumatore, poiché il fumo di sigaretta può influenzare il suo trattamento con Bamifix.

##### **Altri medicinali e Bamifix**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Alcuni farmaci che interagiscono con la teofillina (farmaco simile alla bamifillina) potrebbero influenzare il trattamento con Bamifix.

Informi quindi il medico se

- assume antibiotici quali, ad esempio, eritromicina e triacetiloleandomicina,
- assume farmaci per il cuore quali, ad esempio, digitale e strofantina.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico, prima di prendere Bamifix.

Sebbene non si siano osservati effetti negativi sulla fertilità, sulla gravidanza, sull'allattamento o sullo sviluppo dell'embrione e/o del feto, come misura precauzionale si consiglia di non prendere Bamifix nei primi mesi di gravidanza, negli ultimi giorni di gravidanza e durante l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Bamifix non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

## **3. Come prendere Bamifix**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 compresse al giorno negli adulti, da assumere per bocca (via orale), 1 al mattino ed 1 alla sera.

**Se prende più Bamifix di quanto deve** avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale, poiché è necessario attuare misure adeguate.

Dosi superiori a quelle terapeutiche possono indurre la comparsa di nausea e di fini tremori che scompaiono riducendo la dose.

### **Se dimentica di prendere Bamifix**

Prosegua regolarmente con la terapia. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

### **Se interrompe il trattamento con Bamifix**

Non interrompa il trattamento senza consultare il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si rivolga al medico se durante la terapia con Bamifix nota:

- mal di testa (cefalea);
- dolore allo stomaco (gastralgia), nausea, cattiva digestione (dispepsia);
- aumento dei battiti del cuore (tachicardia);
- eruzioni cutanee, che di norma regrediscono spontaneamente o con l'impiego di adatti medicinali per curarne i sintomi;

- tremori.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Bamifix**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Bamifix**

Il principio attivo è: bamifillina cloridrato.

Una compressa contiene 900 mg di bamifillina cloridrato.

Gli altri componenti sono: polietilenglicole, idrossipropilmetilcellulosa, metilcellulosa, polimeri metacrilici, magnesio stearato, titanio biossido.

### **Descrizione dell'aspetto di Bamifix e contenuto della confezione**

Questo medicinale è disponibile in astuccio contenente 30 compresse rivestite da 900 mg.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo 26/A – Parma.

### **Produttore**

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Officina di Parma, Via San Leonardo 96.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.**