

**L'AUTORIZZAZIONE RELATIVA A LIDOMOL RISULTA DECADUTA DAL 01/08/2013 (SUNSET  
CLAUSE).**

**IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA**

**LIDOMOL 10 g/100 ml spray per mucosa orale flacone nebulizzatore 60 ml  
(Lidocaina cloridrato)**

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono:

Lidocaina cloridrato g 10

Eccipienti: saccarina sodica biidrata, polietilenglicole 400, cetilpiridinio cloruro, etanolo 96°, sodio fosfato monobasico, sodio idrossido, acqua depurata.

Ogni spruzzo eroga circa 10 mg di lidocaina cloridrato.

FORMA FARMACEUTICA E PRESENTAZIONE

Soluzione acquosa per uso topico in flacone nebulizzatore da 60 ml, corredato di beccuccio dosatore. LIDOMOL 10 g/100 ml spray per mucosa orale non contiene gas propellente.

CATEGORIA

Anestetico locale di superficie per uso odontoiatrico.

TITOLARE A.I.C.

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., S.S. 67, Loc. Granatieri, Scandicci (FI)  
Prodotto e controllato da: PIERREL SpA Strada Statale Appia 7 bis n. 46-48 Capua (CE)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Tutti gli interventi conservativi e chirurgici in odontostomatologia. In particolare è indicato per:

- eliminazione del dolore alla puntura
- incisione di ascessi superficiali
- piccoli interventi chirurgici, estirpazione di schegge d'osso, residui di radici mobili, ecc.
- estrazione di denti decidui e di denti mobili
- preparazione di piccole cavità
- detartarizzazione e cura delle tasche (paradontosi)
- eliminazione degli urti di vomito in occasione di presa d'impronte e nelle radiografie
- impiego di materiali plastici a rapido indurimento e nell'adattamento indolore di protesi
- applicazione di ponti e corone

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità già nota verso i componenti. Non usare in età pediatrica.

OPPORTUNE PRECAUZIONI PER L'USO

Solo per applicazione locale. Non superare la dose massima raccomandata.

Durante l'impiego la bomboletta va tenuta possibilmente in posizione verticale.

In caso di applicazione al limite tra palato duro e molle, occorre disporre il capo del paziente e il beccuccio erogatore in modo tale da evitare l'inalazione da parte del paziente.

Non spruzzare negli occhi.

POSOLOGIA E MODALITA' DI IMPIEGO

Un'unica pressione sulla testata di spruzzo libera automaticamente una dosata quantità di LIDOMOL spray. Ogni spruzzo corrisponde a circa 100 µl di soluzione pari a 10 mg di lidocaina cloridrato.

Si raccomanda come limite massimo la somministrazione di 2 spruzzi per quadrante di mucosa orale; non si deve in nessun caso superare 3 spruzzi per quadrante in un intervallo di un'ora e mezzo.

EFFETTI INDESIDERATI

Il paziente deve essere invitato a comunicare al proprio medico qualsiasi effetto indesiderato insorto a seguito dell'applicazione del farmaco.

**Atto autorizzativo: Variazione N1B/09/786 (GU 75 del 02/07/2009, Parte II)**

**DATA DI SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Attenzione: non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione del Ministero della Salute: Giugno 2005

---

MOLTENI FARMACEUTICI

Agenzia Italiana del Farmaco