

## **STERIDROLO®**

Cloramina

antisettico-disinfettante

USO ESTERNO

### **COMPOSIZIONE**

1 busta da g 5 contiene:

Cloramina g 5 (pari a g 1,25 di cloro attivo/busta)

1 busta da g 2,5 contiene:

Cloramina g 2,5

(pari a g 0,625 di cloro attivo/busta)

### **FORMA FARMACEUTICA E PRESENTAZIONE**

Polvere da solubilizzare in acqua.

Confezione da 10 buste da g 5

Confezione da 12 buste da g 2,5

### **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Disinfettante per uso topico dermatologico e per uso ginecologico.

### **TITOLARE A.I.C.**

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., S.S. 67, Località Granatieri, Scandicci (Firenze).

### **Confezionato da:**

Sigmar Italia SpA Via Sombreno 11 Almè (BG)

### **Rilasciato da:**

L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.

Strada Statale 67, Loc. Granatieri Scandicci (FI)

oppure:

Sigmar Italia SpA Via Sombreno 11 Almè (BG)

### **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.); disinfezione dei genitali esterni.

### **CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità verso i prodotti che liberano cloro.

### **PRECAUZIONI PER L'USO**

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.

Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico.

## **INTERAZIONI**

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

## **AVVERTENZE**

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. Il prodotto è solo per uso topico: in caso di ingestione accidentale, provocare il vomito e contattare un medico. L'ingestione accidentale della soluzione disinfettante può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Il prodotto libera cloro: evitare che venga a contatto con metalli.

## **DOSE, MODO, TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE**

### **Buste da g 5**

*Disinfezione della cute lesa:* 2 buste in 1 litro di acqua.

*Disinfezione dei genitali esterni:* 1 busta in 2 litri di acqua.

### **Buste da g 2,5**

*Disinfezione della cute lesa:* 2 buste in  $\frac{1}{2}$  litro di acqua.

*Disinfezione dei genitali esterni:* 1 busta in 1 litro di acqua.

Ripetere l'operazione 2-3 volte al giorno, salvo diversa prescrizione medica.

Non superare le concentrazioni e le dosi consigliate.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Il prodotto può dare irritazione congiuntivale.

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Comunicare al proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

**Attenzione:** non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

## **PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare il medicinale a temperatura non superiore ai 30°C.

**La soluzione preparata per l'uso** deve essere conservata ben chiusa a temperatura ambiente e al riparo della luce. In queste condizioni è stabile per almeno tre mesi.

## **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Ultima revisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Giugno 2013

---

**MOLTENI FARMACEUTICI**