

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Meteosim 40 mg compresse masticabili**

Simeticone

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o farmacista o l'infermiere le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni

#### **Contenuto di questo foglio:**

- 1. Che cos'è METEOSIM e a cosa serve**
- 2. Cosa deve sapere prima di prendere METEOSIM**
- 3. Come prendere METEOSIM**
- 4. Possibili effetti indesiderati**
- 5. Come conservare METEOSIM**
- 6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **1. Che cos'è METEOSIM e a cosa serve**

METEOSIM contiene il principio attivo simeticone, un antimeteorico che agisce favorendo l'eliminazione dei gas che si formano nello stomaco e nell'intestino .

METEOSIM è usato negli adulti per trattare i sintomi nei casi di:

- meteorismo gastro-enterico
- aerofagia

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere METEOSIM**

##### **Non prenda METEOSIM**

- se è allergico al simeticone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Meteosim.  
Non superare le dosi consigliate.

### **Altri medicinali e METEOSIM**

Non sono note nè sono state segnalate interazioni con altri farmaci.  
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

Non vi sono dati adeguati sull'uso di Meteosim nelle donne in gravidanza, pertanto non deve essere usato in gravidanza a meno di una reale necessità e dopo la valutazione del rischio/beneficio da parte del medico.

#### Allattamento

Non è noto se il simeticone venga escreto nel latte materno. L'escrezione del simeticone nel latte materno non è stata studiata negli animali. La decisione se continuare/interrompere la terapia a base di simeticone dovrebbe essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il neonato e della terapia a base di simeticone per la donna.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non si segnalano effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.

### **METEOSIM contiene lattosio**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere METEOSIM**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista o dell'infermiere. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista o l'infermiere.

La dose raccomandata è:

Adulti: 4 compresse al giorno (2 alla fine di ogni pasto principale).

Le compresse devono essere masticate.

Attenzione: non superi le dosi indicate senza consiglio del medico.

Prenda questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento (circa 7 giorni). Non utilizzi per periodi prolungati senza il consiglio del medico.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Se prende più METEOSIM di quanto deve**

Non sono riportati fenomeni di dosaggio eccessivo con l'uso di Meteosim.

Se accidentalmente assume troppe compresse, contatti immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di prendere METEOSIM**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista o all'infermiere.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Tuttavia, non sono stati messi in evidenza effetti indesiderati dovuti a Meteosim.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite: [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare METEOSIM**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

**Cosa contiene METEOSIM**

Il principio attivo è simeticone

Una compressa contiene 40 mg di simeticone.

Gli altri componenti sono saccarina sodica, acido alginico, lattosio, sodio bicarbonato, povidone, calcio silicato monoidrato, metilcellulosa.

**Descrizione dell'aspetto di METEOSIM e contenuto della confezione**

Astuccio da 50 compresse da 40 mg in blister.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. Via Fossignano, 2 - Aprilia (LT)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**