RILAPROST
Estratto depurato di Serenoa repens

COMPOSIZIONE:
Ogni capsula contiene:
Principio attivo: Estratto depurato di Serenoa repens mg 160;
Componenti dell'involucro di gelatina: Gelatina F.U., Glicerolo F.U., Etile p-idrossibenzoato sodico (E 215), Propile p-idrossibenzoato sodico (E 217), Titanio biossido (E 171) F.U., Ferro ossido giallo (E 172), Acqua depurata F.U.;

FORMA FARMACEUTICA:
30 capsule da 160 mg

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Rilaprost è un farmaco indicato per il trattamento della ipertrofia prostatica benigna e della sintomatologia ad essa correlata. Il suo principio attivo, l'estratto depurato di Serenoa repens, è in grado di ridurre l'edema della prostata e di modificare, esclusivamente a tale livello, l'attivita degli ormoni che ne favoriscono la crescita (iperplasia).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
LABORATORI GUIDOTTI S.p.A. - Via Livornese, 897 – PISA – La Vettola
Su licenza Indena S.p.A. – Milano

PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l. - Via Sette Santi, 3 - Firenze
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l. - Via Campo di Pile – L'Aquila.
Menarini – Von Heyden GmbH – Leipziger Strasse, 7-13 – Dresda (Germania)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Turbe funzionali dell'ipertrofia (iperplasia) prostatica benigna.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità individuale verso il farmaco.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI
Non sono finora note interazioni con altri medicinali.

EFFETTI SULLA CAPACITA' DI GUIDARE E SULL'USO DI MACCHINE
Nessuno.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Normalmente si consiglia la somministrazione di 1 capsula 2 volte al giorno (mattina e sera) ai pasti. La posologia può comunque essere variata a seconda del giudizio del medico. E' consigliabile proseguire la terapia per un lungo periodo di tempo, comunque non inferiore a 30 giorni.
Sovradosaggio
Finora non sono stati segnalati sintomi da sovradosaggio. Tuttavia in caso di assunzione eccessiva si consiglia di indurre rapidamente il vomito o fare eseguire una lavanda gastrica.

EFFETTI INDESIDERATI
Occasionalmente può comparire nausea, specie qualora il farmaco venga assunto a stomaco vuoto. Comunicare al medico curante o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo.

SCADENZA E NORME DI CONSERVAZIONE
Per la data di scadenza si rimanda a quella riportata sulla confezione.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Conservare il medicinale in luogo asciutto.

DATA ULTIMA APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ: OTTOBRE 2007

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).