

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### CLOFEND 7,08 mg/ml sospensione orale

L-Cloperastina fendizoato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è CLOFEND e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere CLOFEND
3. Come prendere CLOFEND
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CLOFEND
6. Contenuto della confezione ed altre informazioni

#### **1. Che cos'è CLOFEND e a cosa serve**

CLOFEND contiene il principio attivo L-cloperastina fendizoato che appartiene ad un gruppo di medicinali, chiamati sedativi della tosse, che calmano la tosse agendo a livello del sistema nervoso centrale .

Questo medicinale è indicato per il trattamento della tosse.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere CLOFEND**

##### **Non prenda CLOFEND**

- se è allergico alla L-cloperastina fendizoato o ad uno qualsiasi degli componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se la persona che deve assumere questo medicinale è un bambino di età compresa tra 0 e 2 anni (primissima infanzia).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere CLOFEND.

##### **Bambini**

Questo medicinale è controindicato nei bambini di età compresa tra 0 e 2 anni (Vedere il paragrafo "Non prenda CLOFEND").

##### **Altri medicinali e CLOFEND**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda questo medicinale con cautela e informi il medico se sta assumendo i seguenti medicinali:

- medicinali che stimolano o deprimono il sistema nervoso centrale;

- antistaminici, usati per il trattamento delle allergie, antiserotoninergici, usati principalmente per il trattamento della depressione e di forme gravi di mal di testa (emicrania), miorilassanti come la papaverina (di tipo papaverinico), usati per ridurre la contrazione dei muscoli, perché la L-cloperastina ne può aumentare gli effetti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in stato di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Eviti di prendere questo medicinale se è nei primi tre mesi di gravidanza. Nei successivi mesi di gravidanza, prenda CLOFEND solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **CLOFEND contiene para-idrossibenzoati**

Questo medicinale contiene para-idrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).


## **3. Come prendere CLOFEND**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Legga attentamente le seguenti istruzioni prima di prendere CLOFEND:

- per aprire il flacone, prema il tappo verso il basso, svitando verso sinistra;
- per chiudere il flacone, avviti il tappo fino in fondo verso destra.

Per dosare il medicinale, usi l'apposito misurino graduato (da 2-3-5 ml).



Negli adulti la dose raccomandata è di 5 ml, 3 volte al giorno.

### **Uso nei bambini**

Nei bambini, la dose deve essere ridotta, in base all'età:

- tra 2 e 4 anni: la dose raccomandata è di 2 ml, 2 volte al giorno.
- tra 4 e 7 anni: la dose raccomandata è di 3 ml, 2 volte al giorno.
- tra 7 e 15 anni: la dose raccomandata è di 5 ml, 2 volte al giorno.

### **Se prende più CLOFEND di quanto deve**

In seguito all'assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale si possono manifestare sintomi di un'eccessiva eccitazione (sovrareccitazione).

Il medico stabilirà la terapia più adatta a lei, in base ai suoi sintomi.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di CLOFEND avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di prendere CLOFEND**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Prenda la normale dose successiva, all'orario stabilito.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati che possono presentarsi raramente sono:

- problemi allo stomaco e all'intestino (disturbi gastrointestinali), lievi e temporanei.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare CLOFEND**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione ed altre informazioni**

### **Cosa contiene CLOFEND**

- Il principio attivo è L-cloperastina fendizoato. 100 ml di sospensione contengono 708 mg di L-cloperastina fendizoato (pari a 400 mg di cloperastina cloridrato).
- Gli altri componenti sono: gomma xantana, poliossietilene stearato, xilitolo, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di banana, acqua deionizzata.

## **Descrizione dell'aspetto di CLOFEND e contenuto della confezione**

Flacone di vetro giallo con capsula a prova di bambino contenente una sospensione con odore di frutta e sapore dolce, gradevole. Sospensione per uso orale da 200 ml.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

FIDIA Farmaceutici S.p.A. – Via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano Terme (PD) – Italia

**Produttore**

MITIM S.r.l. – Via Cacciamali, 34-36-38 – 25125 Brescia – Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco