

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utente**  
**CLOREXIFARM 20% concentrato per soluzione cutanea**  
Clorexidina gluconato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è CLOREXIFARM e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM
3. Come usare CLOREXIFARM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CLOREXIFARM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Cos'è CLOREXIFARM e a che cosa serve**

CLOREXIFARM contiene il principio attivo clorexidina gluconato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei germi.

CLOREXIFARM è indicato per pulire e disinfettare la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

### **2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM**

#### **Non usi CLOREXIFARM**

- se è allergico alla clorexidina gluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CLOREXIFARM.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).

Non ingerisca questo medicinale, in quanto si possono verificare conseguenze gravi, anche mortali.

Non applichi questo medicinale sugli occhi o nella parte interna dell'orecchio.

Eviti di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se usa CLOREXIFARM per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilizzazione). In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico che stabilirà una terapia idonea.

Prima di applicare una medicazione (medicazioni di tipo occlusivo) su aree del corpo che sono state trattate con CLOREXIFARM, è necessario assicurarsi che non sia presente un eccesso di medicinale in questa zona.

### **Bambini**

CLOREXIFARM può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto in quelli nati prematuramente.

### **Altri medicinali e CLOREXIFARM**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CLOREXIFARM, eviti di usare altri medicinali simili (antisettici e/o detergenti).

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

## **3. Come usare CLOREXIFARM**

Usi CLOREXIFARM seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Usi questo medicinale solo dopo opportuna diluizione in acqua (5 ml di CLOREXIFARM 20% in 2 litri di acqua).

Tamponi la cute con del cotone imbevuto di CLOREXIFARM diluito.

Se necessario, ripeta l'applicazione fino ad un massimo di 3-4 volte al giorno.

Non superi le dosi indicate.

### **Se usa più CLOREXIFARM di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di CLOREXIFARM avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):

- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti sono generalmente transitori e non richiedono modifiche del trattamento;
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare CLOREXIFARM**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene CLOREXIFARM**

- Il principio attivo è clorexidina gluconato. 100 g di soluzione contengono 20 g di clorexidina gluconato.
- L'altro componente è acqua depurata.

##### **Descrizione dell'aspetto di CLOREXIFARM e contenuto della confezione**

Flacone da 1000 ml di soluzione con tappo a vite.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco