

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

CLOREXIFARM ALCOLICO 0,5% + 70% soluzione cutanea

Clorexidina gluconato e alcool etilico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è CLOREXIFARM ALCOLICO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM ALCOLICO
3. Come usare CLOREXIFARM ALCOLICO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CLOREXIFARM ALCOLICO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CLOREXIFARM ALCOLICO e a cosa serve

CLOREXIFARM ALCOLICO contiene due principi attivi: la clorexidina gluconato e l'alcool etilico che appartengono ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici. Questi medicinali agiscono disinfettando la pelle.

CLOREXIFARM ALCOLICO è indicato per pulire e disinfettare:

- la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni);
- le mani prima di interventi chirurgici.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM ALCOLICO

Non usi CLOREXIFARM ALCOLICO:

- se è allergico alla clorexidina, a sostanze simili o all'alcool .

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CLOREXIFARM ALCOLICO.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).

Eviti di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se usa CLOREXIFARM ALCOLICO per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione).

Questo medicinale è tossico per gli occhi, il cervello e le membrane che lo rivestono (meningi), e per la parte interna dell'orecchio. Pertanto, eviti il contatto di questo medicinale con queste zone del corpo.

Bambini

Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. CLOREXIFARM ALCOLICO può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e CLOREXIFARM ALCOLICO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CLOREXIFARM ALCOLICO eviti di usare altri disinfettanti o detergenti.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare CLOREXIFARM ALCOLICO

Usi CLOREXIFARM ALCOLICO seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Uso nella disinfezione della pelle

Applichi questo medicinale puro (non diluito) per disinfettare la pelle o le ferite utilizzando cotone o una garza imbevuti di CLOREXIFARM ALCOLICO e strofinando per almeno 30 secondi. Ripeta l'operazione per 2-3 volte al giorno.

Uso nella disinfezione delle mani

Per disinfettare le mani prima di un intervento chirurgico, le lavi ripetutamente con 5-6 ml di prodotto per almeno un minuto. Non superi le dosi consigliate.

Non usi quantitativi eccessivi del prodotto ed eviti che la soluzione si accumuli nelle pieghe cutanee o sotto il corpo del paziente o goccioli sulle lenzuola o altro materiale che potrebbe esserle a stretto contatto. Dove sia necessario applicare medicazioni occlusive ad aree precedentemente esposte a Clorexifarm Alcolico, faccia particolare attenzione al fine di garantire che non sia presente prodotto in eccesso prima dell'applicazione della medicazione.

Se usa più CLOREXIFARM ALCOLICO di quanto deve

Se non supera le dosi consigliate non c'è rischio di sovradosaggio.

L'ingestione o l'inalazione accidentale può causare gravi effetti indesiderati, compresa la morte.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di CLOREXIFARM ALCOLICO avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):

- irritazione della pelle nei neonati, come bruciature (ustioni chimiche)
- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza), questi effetti non hanno conseguenze e non richiedono modifiche del trattamento;
- se usa questo medicinale frequentemente possono verificarsi irritazione e secchezza della pelle.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CLOREXIFARM ALCOLICO

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce. Questo medicinale è facilmente infiammabile.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CLOREXIFARM ALCOLICO

- I principi attivi sono clorexidina gluconato e alcool etilico. 100 g di soluzione contengono 0,5 g di clorexidina digluconato e 70 g di alcol etilico 96%.

- Gli altri componenti sono: acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CLOREXIFARM ALCOLICO e contenuto della confezione

Flaconi da 250 ml, 500 ml o 1000 ml di soluzione.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Produttore

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Fleming 7 Zona industriale-37026 Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco