

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Tasdurit 0,5 mg capsule molli

Dutasteride

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Tasdurit e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Tasdurit
3. Come prendere Tasdurit
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Tasdurit
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Tasdurit e a cosa serve

Tasdurit viene impiegato per trattare i soggetti di sesso maschile con prostata ingrossata (iperplasia prostatica benigna) - un aumento di tipo noncanceroso del volume della ghiandola prostatica, dovuto ad una produzione eccessiva di un ormone chiamato diidrotestosterone.

Il principio attivo è la dutasteride. Essa appartiene ad una classe di farmaci chiamati inibitori della 5-alfa reduttasi.

Se la prostata aumenta di volume, può portare a problemi urinari come la difficoltà nel passaggio dell'urina e la necessità di urinare frequentemente. Questo può anche comportare che il flusso dell'urina diventi più lento e meno forte. Se non trattata, c'è il rischio che il flusso di urina venga completamente bloccato (ritenzione urinaria acuta). Ciò richiede un trattamento medico immediato. In alcuni casi è necessario ricorrere alla chirurgia per rimuovere o ridurre il volume della prostata. Tasdurit riduce la produzione di diidrotestosterone e ciò favorisce la diminuzione del volume prostatico e allevia i sintomi. Ciò riduce il rischio della ritenzione urinaria acuta e la necessità di intervento chirurgico.

Tasdurit può essere impiegato con un altro medicinale chiamato tamsulosina (usato nel trattamento dei sintomi dell'aumento della prostata).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Tasdurit

Non prenda Tasdurit

- se è allergico al dutasteride o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se ha una malattia epatica grave.
- questo medicinale è indicato solamente per gli uomini. Non deve essere preso da donne, da bambini o da adolescenti.

➔ Informi il medico se pensa che uno dei casi sopraelencati la riguardi.

Avvertenze e precauzioni

- In alcuni studi clinici più pazienti che assumevano dutasteride e un altro medicinale chiamato alfa bloccante come la tamsulosina, sono andati incontro ad insufficienza cardiaca rispetto ai pazienti trattati solo con dutasteride o solo con un alfa bloccante. L'insufficienza cardiaca significa che il cuore non pompa il sangue così bene come deve.
- Si accerti che il medico sia informato dei suoi problemi al fegato. Se lei ha avuto una qualsiasi malattia del fegato possono essere necessari ulteriori controlli mentre sta assumendo Tasdurit.
- Donne, bambini e adolescenti devono evitare il contatto con capsule di Tasdurit non integre, perché il principio attivo viene assorbito attraverso la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
- Usi il profilattico durante il rapporto sessuale. La dutasteride è stata trovata nel liquido seminale di uomini in cura con Tasdurit. Se la sua partner è o può essere incinta, deve evitare di esporla al suo liquido seminale in quanto la dutasteride può compromettere il normale sviluppo di un bambino maschio. È stato dimostrato che la dutasteride riduce la conta spermatica, il volume del seme e la motilità spermatica. Questo può diminuire la sua fertilità.
- Tasdurit influenza l'esame del PSA (*antigene specifico prostatico*), che viene impiegato in alcuni casi per rivelare la presenza di cancro alla prostata. Il medico deve essere a conoscenza di questo effetto e può ugualmente prescrivere l'esame per scoprire se lei ha un cancro alla prostata. Se deve sottoporsi all'esame del PSA, informi il medico che sta prendendo Tasdurit. Gli uomini che assumono Tasdurit devono eseguire l'esame del PSA regolarmente.
- In uno studio clinico condotto su uomini ad aumentato rischio di cancro alla prostata, gli uomini che assumevano Tasdurit hanno avuto più frequentemente una forma grave di cancro alla prostata rispetto agli uomini che non assumevano Tasdurit. L'effetto di Tasdurit su questa forma grave di cancro alla prostata non è chiaro.
- Tasdurit può causare ingrossamento e dolenzia della mammella. Se ciò diviene preoccupante, o se nota la presenza di noduli della mammella o secrezione del capezzolo, deve parlare con il medico di questi cambiamenti poiché essi possono essere segni di una condizione grave, come il cancro della mammella.

➔ Si rivolga al medico o al farmacista se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Tasdurit.

Bambini e adolescenti

Questo medicinale è indicato solamente per gli uomini. Le capsule non integre non devono essere maneggiate da donne, bambini o adolescenti.

Altri medicinali e Tasdurit

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Alcuni medicinali possono interagire con Tasdurit e possono aumentare la possibilità di avere effetti indesiderati. Questi medicinali comprendono:

- verapamil o diltiazem (per la pressione alta)
- ritonavir o indinavir (per l'HIV)
- itraconazolo o chetaconazolo (per le infezioni fungine)
- nefazodone (un antidepressivo)
- alfa bloccanti (per l'aumento della prostata o la pressione alta).

➔ Informi il medico se sta prendendo uno qualsiasi di questi medicinali. Può essere necessario ridurre la dose di Tasdurit.

Tasdurit con cibi e bevande

Tasdurit può essere assunto con o senza cibo.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza non deve maneggiare capsule non integre. La dutasteride è assorbita attraverso la pelle e può interferire con il normale sviluppo di un bambino maschio. Questo è particolarmente rischioso nelle prime 16 settimane di gravidanza.

Usi il profilattico durante il rapporto sessuale. La dutasteride è stata ritrovata nel liquido seminale degli uomini che assumevano Tasdurit. Se la sua partner è in gravidanza o sospetta di esserlo, deve evitare che venga a contatto con il suo liquido seminale.

Tasdurit ha mostrato di ridurre la conta spermatica, il volume del liquido seminale e il movimento degli spermatozoi. Pertanto la fertilità maschile può diminuire.

➔ Chieda consiglio al medico se una donna in gravidanza è venuta in contatto con la dutasteride.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

È improbabile che Tasdurit abbia effetti sulla capacità di guidare o di usare macchinari.

Tasdurit contiene lecitina di soia

Questo medicinale contiene lecitina di soia che potrebbe contenere olio di soia. Se è allergico alle arachidi o alla soia, non usi questo medicinale.

3. Come prendere Tasdurit

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Se non lo assume regolarmente il controllo dei livelli del PSA può essere influenzato.

La dose raccomandata

La dose raccomandata è di una capsula (0,5 mg) da assumere una volta al giorno. Ingoi le capsule intere con dell'acqua. Non masticare o aprire le capsule. Il contatto con il contenuto delle capsule può irritare la bocca o la gola. Le capsule può essere assunto con o senza cibo.

Il trattamento con Tasdurit è a lungo termine. Alcuni soggetti notano un precoce miglioramento dei sintomi. Tuttavia, altri possono aver bisogno di prendere Tasdurit per 6 mesi o più prima che cominci a fare effetto. Continui a prendere Tasdurit per tutto il tempo che le dice il medico.

Compromissione epatica

In caso di problemi al fegato (da lievi a moderati), rivolgersi al medico o al farmacista. L'assunzione di Tasdurit non è raccomandata a pazienti con gravi malattie epatiche (vedere la sezione "Non prenda Tasdurit").

Se prende più Tasdurit di quanto deve

Se assume più capsule di Tasdurit di quanto prescritto, contatti il medico o il farmacista per un consiglio.

Se dimentica di prendere Tasdurit

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Assuma la dose successiva come di consueto.

Se interrompe il trattamento con Tasdurit

Non interrompa l'assunzione di Tasdurit senza prima consultare il medico. Ci possono volere 6 mesi o più prima che lei noti un miglioramento.

➔ Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Reazione allergica

I segni di reazioni allergiche possono includere:

- eruzione cutanea (che può dare prurito)

- orticaria (come arrossamento e prurito)
- gonfiore delle palpebre, del viso, delle labbra, delle braccia o delle gambe.

→ Contatti immediatamente il medico se presenta uno qualsiasi di questi sintomi e smetta di assumere Tasdurit.

Comuni (possono interessare fino a 1 uomini su 10):

- incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione (*impotenza*), che può continuare anche dopo aver interrotto l'assunzione di Tasdurit
- diminuzione del desiderio sessuale (*libido*), che può continuare anche dopo aver interrotto l'assunzione di Tasdurit
- difficoltà di eiaculazione, che può continuare anche dopo aver interrotto l'assunzione di Tasdurit
- ingrossamento o indolenzimento mammario (*ginecomastia*)
- vertigine se assunto insieme a tamsulosina.

Non comuni (possono interessare fino a 1 uomini su 100):

- Insufficienza cardiaca (il cuore riduce la sua efficienza nel pompare sangue nel corpo. Si potrebbero presentare sintomi come insufficienza respiratoria, estrema stanchezza e gonfiore alle caviglie e alle gambe).
- perdita dei peli (generalmente dal corpo) o crescita dei peli.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- Umore depresso.
- Dolore e gonfiore testicolare.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Tasdurit

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola o sul blister in alluminio. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Conservi il blister nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Tasdurit

- Il principio attivo è la dutasteride. Ogni capsula molle contiene 0,5 mg di dutasteride.
- Gli altri componenti sono:
 - nucleo della capsula: glicole propilenico monocaprilato e butilidrossitoluene.
 - rivestimento della capsula: gelatina, glicerolo, titanio diossido (E171), trigliceridi (a catena media), lecitina. (può contenere olio di soia).(E322)

Descrizione dell'aspetto di Tasdurit e contenuto della confezione

Tasdurit capsule molli sono oblunghe capsule molli di gelatina (circa 16,5 x 6,5 mm) di colore giallo chiaro, piene di liquido trasparente. Sono disponibili in confezioni da tre blister trasparenti (PVC-PE-PVDC)/blister di alluminio da 10, 30, 50, 60 e 90 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
VIA DELLE ANDE, 15, 00144 – ROMA

Produttore:

Laboratorios LEÓN FARMA, SA
Polígono Industrial Navatejera
C/La Vallina, s/n -24008 Villaquilambre -León
SPAGNA

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Danimarca Tasdurit
Italia: Tasdurit

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il : mese AAAA.