

Soggetto a prescrizione medica (RR) (valido solo per le confezioni da 28, 30, 50x1, 60 e 90)

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

TICERIN

Cetirizina dicloridrato

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è Ticerin e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ticerin
3. Come prendere Ticerin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ticerin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Ticerin e a che cosa serve

Cetirizina dicloridrato è il principio attivo di Ticerin. Ticerin è un medicinale antiallergico.

Negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Ticerin è indicata:

- per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;
- per il sollievo dall'orticaria.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Ticerin

Non prenda TICERIN

- se è allergico (ipersensibile) al principio attivo di Ticerin o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Ticerin (elencati al paragrafo 6), all'idrossizina o ai derivati della piperazina (principi attivi di altri medicinali strettamente correlati).

- se ha una grave malattia renale (insufficienza renale grave con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min)

Avvertenze e precauzioni

Se è un paziente con insufficienza renale, si rivolga al medico; se necessario, dovrà prendere una dose inferiore. La nuova dose sarà determinata dal medico.

Se ha difficoltà a urinare (problemi al midollo spinale, alla prostata o alla vescica), chiedi consiglio al medico.

Se è un paziente epilettico o un paziente a rischio di convulsioni, deve chiedere consiglio al medico.

Se deve sottoporsi a un test allergologico cutaneo, informi il medico che sta prendendo Ticerin. Generalmente dovrà interrompere l'assunzione di qualsiasi medicinale per un periodo di 3 giorni prima del test allergologico cutaneo.

Non sono state osservate interazioni clinicamente significative tra l'alcol (ad un livello ematico dello 0,5 per mille (g/l) corrispondente ad un bicchiere di vino) e la cetirizina usata alle dosi raccomandate. Tuttavia non sono disponibili dati sulla sicurezza del prodotto quando sono assunte insieme dosi più elevate di cetirizina e alcol. Pertanto, come per tutti gli antistaminici, si raccomanda di evitare l'assunzione di Ticerin con alcol.

Altri medicinali e Ticerin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo/usando, ha recentemente assunto/usato o potrebbe assumere/usare qualsiasi altro medicinale.

Dato il profilo della cetirizina, non sono attese interazioni con altri farmaci.

Assunzione di Ticerin con il cibo

Il cibo non influenza significativamente l'assorbimento di cetirizina.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Come per altri farmaci, l'uso di Ticerin deve essere evitato nelle donne in gravidanza. L'uso accidentale del farmaco da parte di una donna in gravidanza non produce alcun effetto nocivo sul feto, tuttavia la somministrazione del medicinale deve essere interrotta.

Non deve prendere Ticerin durante l'allattamento perché la cetirizina passa nel latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Gli studi clinici non hanno mostrato alcuna evidenza di compromissione dell'attenzione della vigilanza e della capacità di guidare dopo l'assunzione di Ticerin alla dose raccomandata.

Se intende guidare, praticare attività potenzialmente pericolose o usare macchinari, non deve superare la dose raccomandata. Deve osservare attentamente la sua risposta al farmaco. Se è un paziente sensibile, può accorgersi che l'uso concomitante di alcol e altri agenti deprimenti il sistema nervoso centrale possono alterare ulteriormente la sua attenzione e la sua capacità di reazione.

Ticerin contiene lattosio

Se il medico le ha detto di essere intollerante ad alcuni zuccheri, chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Ticerin

- Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

-

Come e quando deve prendere Ticerin?

Queste linee guida valgono a meno che il medico non le abbia fornito istruzioni diverse sull'uso di *Ticerin*.

Segua le presenti istruzioni, altrimenti *Ticerin* potrebbe non essere completamente efficace.

Le compresse devono essere deglutite con un bicchiere di liquido.

Adulti e adolescenti a partire da 12 anni
10 mg una volta al giorno come 1 compressa.

Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni
5 mg due volte al giorno come mezza compressa due volte al giorno.

Pazienti con compromissione moderata della funzione renale

Nei pazienti con compromissione moderata della funzione renale la dose raccomandata è di 5 mg una volta al giorno.

Se soffre di una grave malattia renale, si rivolga al medico o al farmacista, che potrà aggiustarle la dose di conseguenza.


Se suo figlio soffre di una malattia renale, si rivolga al medico o al farmacista che potrà aggiustare la dose in base alle esigenze di suo figlio.

La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Istruzioni per l'uso

Se il suo trattamento con Ticerin prevede la divisione delle compresse, deve preferibilmente fare come segue.

Ponga la compressa su una superficie dura e piana (come il piano di un tavolo o un piatto) con la linea di incisione rivolta verso l'alto. Quindi prema contemporaneamente con le dita (indici o pollici) in modo breve ma deciso sui bordi esterni a destra e a sinistra della linea di incisione, come mostrato nella figura più sotto.



Se ha la sensazione che l'effetto di *Ticerin* sia troppo debole o troppo forte, informi il medico.

Durata del trattamento

La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal corso dei suoi disturbi e viene stabilita dal medico.

Se prende più TICERIN di quanto deve

Se crede di aver preso un sovradosaggio di *Ticerin*, informi il medico. Il medico deciderà quali misure intraprendere, se necessario.

Dopo un sovradosaggio possono verificarsi gli effetti indesiderati descritti di seguito con intensità aumentata. Sono stati riportati effetti avversi come confusione, diarrea, capogiri, stanchezza, mal di testa, malessere, dilatazione delle pupille, prurito, irrequietezza, sedazione, sonnolenza, stupore, battito cardiaco accelerato anomalo, tremori e ritenzione urinaria.

Se dimentica di prendere TICERIN

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Ticerin

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati nell'esperienza post-marketing.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- spossatezza,
- secchezza della bocca, nausea, diarrea,
- capogiri, mal di testa,
- sonnolenza,
- faringite, rinite (nei bambini)

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- dolore addominale,
- astenia (estrema spossatezza), malessere,
- parestesia (sensazioni anomale sulla pelle),
- agitazione,
- prurito, rash

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- tachicardia (battito cardiaco accelerato)
- reazioni allergiche,
- edema (gonfiore),
- funzionalità del fegato anomala,
- aumento di peso,
- convulsioni,
- aggressività, confusione, depressione, allucinazioni, insonnia,
- orticaria

Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- trombocitopenia (basso livello di piastrine nel sangue),
- disturbo dell'accomodazione (difficoltà di messa a fuoco), vista offuscata, oculorotazione (gli occhi compiono movimenti circolari non controllati),
- sincope, discinesia (movimenti involontari), distonia (contrazioni muscolari anomale e prolungate), tremore, disgeusia (gusto alterato),
- tic (spasmo abituale),
- eliminazione anomala delle urine (enuresi notturna, dolore e/o difficoltà a urinare),
- angioedema (grave reazione allergica che causa gonfiore del viso o della gola), eruzione fissa da farmaco gravi reazioni allergiche,

frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- amnesia, compromissione della memoria
- aumento dell'appetito,
- idea suicida (pensieri di suicidio ricorrenti o ossessione per il suicidio)
- vertigini (sensazione di rotazione o movimento)
- ritenzione urinaria (incapacità di svuotare completamente la vescica)

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Ai primi sintomi di ipersensibilità, interrompa l'assunzione di Ticerin. Il suo medico valuterà la gravità e deciderà quali altre misure intraprendere, se necessario.

5. Come conservare Ticerin

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TICERIN

Il principio attivo è cetirizina dicloridrato .

Ciascuna compressa rivestita con film contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato.

Gli altri componenti sono lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale, magnesio stearato, titanio diossido (E171), ipromellosa (E464) e macrogol.

Descrizione dell'aspetto di TICERIN e contenuto della confezione

La compressa rivestita con film è di colore da bianco a biancastro, rotonda, biconvessa, con una linea di incisione su un lato e di circa 6,5 mm di diametro.

La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Blister in PVC/PVDC/alluminio.

Blister da 7, 14, 28, 30, 50x1, 60 e 90 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren-Germany

TEVA SANTE Rue Bellocier,89100 Sens-France

Questo prodotto medicinale è stato autorizzato negli stati membri dell'EEA con le seguenti denominazioni:

Denmark: Zynor

France: CETIRIZINE RATIO CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Ireland: Zynor Allergy 10mg Film-coated Tablets

Italy: TICERIN

Sweden: Cetirizine Teva 10mg filmdragerade tabletter

United Kingdom: Cetirizine 10 mg Film-Coated Tablets

Netherland: Cetirizine diHCl 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il <{MM/AAAA}> <{mese AAAA}>
inserire**

SOP (Medicinale non soggetto a prescrizione medica, valido solo per le confezioni da 7, 14,)

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

TICERIN

Cetirizina dicloridrato

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è Ticerin e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ticerin
3. Come prendere Ticerin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ticerin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Ticerin e a che cosa serve

Cetirizina dicloridrato è il principio attivo di Ticerin. Ticerin è un medicinale antiallergico. Negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Ticerin è indicata:

- per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

- per il sollievo dall'orticaria.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Ticerin

Non prenda Ticerin

- se è allergico (ipersensibile) al principio attivo di Ticerin o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Ticerin (elencati al paragrafo 6), all'idrossizina o ai derivati della piperazina (principi attivi di altri medicinali strettamente correlati).
- se ha una grave malattia renale (insufficienza renale grave con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min)

Avvertenze e precauzioni

Se è un paziente con insufficienza renale, si rivolga al medico; se necessario, dovrà prendere una dose inferiore. La nuova dose sarà determinata dal medico.

Se ha difficoltà a urinare (problemi al midollo spinale, alla prostata o alla vescica), chiedi consiglio al medico.

Se è un paziente epilettico o un paziente a rischio di convulsioni, deve chiedere consiglio al medico.

Se deve sottoporsi a un test allergologico cutaneo, informi il medico che sta prendendo Ticerin. Generalmente dovrà interrompere l'assunzione di qualsiasi medicinale per un periodo di 3 giorni prima del test allergologico cutaneo.

Non sono state osservate interazioni clinicamente significative tra l'alcol (ad un livello ematico dello 0,5 per mille (g/l) corrispondente ad un bicchiere di vino) e la cetirizina usata alle dosi raccomandate. Tuttavia non sono disponibili dati sulla sicurezza del prodotto quando sono assunte insieme dosi più elevate di cetirizina e alcol. Pertanto, come per tutti gli antistaminici, si raccomanda di evitare l'assunzione di Ticerin con alcol.

Altri medicinali e Ticerin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo/usando, ha recentemente assunto/usato o potrebbe assumere/usare qualsiasi altro medicinale.

Dato il profilo della cetirizina, non sono attese interazioni con altri farmaci.

Assunzione di Ticerin con il cibo

Il cibo non influenza significativamente l'assorbimento di cetirizina.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Come per altri farmaci, l'uso di Ticerin deve essere evitato nelle donne in gravidanza. L'uso accidentale del farmaco da parte di una donna in gravidanza non produce alcun effetto nocivo sul feto, tuttavia la somministrazione del medicinale deve essere interrotta.

Non deve prendere Ticerin durante l'allattamento perché la cetirizina passa nel latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Gli studi clinici non hanno mostrato alcuna evidenza di compromissione dell'attenzione della vigilanza e della capacità di guidare dopo l'assunzione di Ticerin alla dose raccomandata.

Se intende guidare, praticare attività potenzialmente pericolose o usare macchinari, non deve superare la dose raccomandata. Deve osservare attentamente la sua risposta al farmaco.

Se è un paziente sensibile, può accorgersi che l'uso concomitante di alcol e altri agenti depressivi il sistema nervoso centrale possono alterare ulteriormente la sua attenzione e la sua capacità di reazione.

Ticerin contiene lattosio

Se il medico le ha detto di essere intollerante ad alcuni zuccheri, chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Ticerin

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

Come e quando deve prendere Ticerin?

Queste linee guida valgono a meno che il medico non le abbia fornito istruzioni diverse sull'uso di *Ticerin*.

Segua le presenti istruzioni, altrimenti *Ticerin* potrebbe non essere completamente efficace.

Le compresse devono essere deglutite con un bicchiere di liquido.

Adulti e adolescenti a partire da 12 anni

10 mg una volta al giorno come 1 compressa.

Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni

5 mg due volte al giorno come mezza compressa due volte al giorno.

Pazienti con compromissione moderata della funzione renale

Nei pazienti con compromissione moderata della funzione renale la dose raccomandata è di 5 mg una volta al giorno.

Se soffre di una grave malattia renale, si rivolga al medico o al farmacista, che potrà aggiustarle la dose di conseguenza.


Se suo figlio soffre di una malattia renale, si rivolga al medico o al farmacista che potrà aggiustare la dose in base alle esigenze di suo figlio.

La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Istruzioni per l'uso

Se il suo trattamento con Ticerin prevede la divisione delle compresse, deve preferibilmente fare come segue.

Ponga la compressa su una superficie dura e piana (come il piano di un tavolo o un piatto) con la linea di incisione rivolta verso l'alto. Quindi preme contemporaneamente con le dita (indici o pollici) in modo breve ma deciso sui bordi esterni a destra e a sinistra della linea di incisione, come mostrato nella figura più sotto.



Se ha la sensazione che l'effetto di *Ticerin* sia troppo debole o troppo forte, informi il medico.

Durata del trattamento

La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal corso dei suoi disturbi e viene stabilita dal medico.

Se prende più TICERIN di quanto deve

Se crede di aver preso un sovradosaggio di *Ticerin*, informi il medico.

Il medico deciderà quali misure intraprendere, se necessario.

Dopo un sovradosaggio possono verificarsi gli effetti indesiderati descritti di seguito con intensità aumentata. Sono stati riportati effetti avversi come confusione, diarrea, capogiri, stanchezza, mal di testa, malessere, dilatazione delle pupille, prurito, irrequietezza, sedazione, sonnolenza, stupore, battito cardiaco accelerato anomalo, tremori e ritenzione urinaria.

Se dimentica di prendere TICERIN

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Ticerin

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati nell'esperienza post-marketing.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- spossatezza,
- secchezza della bocca, nausea, diarrea,

- capogiri, mal di testa,
- sonnolenza,
- faringite, rinite (nei bambini)

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- dolore addominale,
- astenia (estrema spossatezza), malessere,
- parestesia (sensazioni anomale sulla pelle),
- agitazione,
- prurito, rash

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- tachicardia (battito cardiaco accelerato)
- reazioni allergiche,
- edema (gonfiore),
- funzionalità del fegato anomala,
- aumento di peso,
- convulsioni,
- aggressività, confusione, depressione, allucinazioni, insonnia,
- orticaria

Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- trombocitopenia (basso livello di piastrine nel sangue),
- disturbo dell'accomodazione (difficoltà di messa a fuoco), vista offuscata, oculorotazione (gli occhi compiono movimenti circolari non controllati),
- sincope, discinesia (movimenti involontari), distonia (contrazioni muscolari anomale e prolungate), tremore, disgeusia (gusto alterato),
- tic (spasmo abituale),
- eliminazione anomala delle urine (enuresi notturna, dolore e/o difficoltà a urinare),
- angioedema (grave reazione allergica che causa gonfiore del viso o della gola), eruzione fissa da farmaco gravi reazioni allergiche,

frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- amnesia, compromissione della memoria
- aumento dell'appetito,
- idea suicida (pensieri di suicidio ricorrenti o ossessione per il suicidio)
- vertigini (sensazione di rotazione o movimento)
- ritenzione urinaria (incapacità di svuotare completamente la vescica)

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Ai primi sintomi di ipersensibilità, interrompa l'assunzione di Ticerin. Il suo medico valuterà la gravità e deciderà quali altre misure intraprendere, se necessario.

5. Come conservare Ticerin

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ticerin

Il principio attivo è cetirizina dicloridrato .

Ciascuna compressa rivestita con film contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato.

Gli altri componenti sono lattosio monidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale, magnesio stearato, titanio diossido (E171), ipromellosa (E464) e macrogol.

Descrizione dell'aspetto di Ticerin e contenuto della confezione

La compressa rivestita con film è di colore da bianco a biancastro, rotonda, biconvessa, con una linea di incisione su un lato e di circa 6,5 mm di diametro.

La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Blister in PVC/PVDC/alluminio.

Blister da 7, 14, 28, 30, 50x1, 60 e 90 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren-Germany

TEVA SANTE Rue Bellocier,89100 Sens-France

Questo prodotto medicinale è stato autorizzato negli stati membri dell'EEA con le seguenti denominazioni:

Denmark: Zynor

France: CETIRIZINE RATIO CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Ireland: Zynor Allergy 10mg Film-coated Tablets

Italy: TICERIN

Sweden: Cetirizine Teva 10mg filmdragerade tabletter

United Kingdom: Cetirizine 10 mg Film-Coated Tablets

Netherland: Cetirizine diHCl 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il <{MM/AAAA}> <{mese AAAA}>
inserire**