

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### Prednisone Teva 5 mg compresse Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Prednisone Teva 5 mg compresse e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Prednisone Teva 5 mg compresse
3. Come prendere Prednisone Teva 5 mg compresse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Prednisone Teva 5 mg compresse
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Prednisone Teva 5 mg compresse e a cosa serve**

Il prednisone è un corticosteroide (glucocorticoide) derivato dal cortisone. E' coinvolto nella regolazione di molti processi metabolici dell'organismo.

Prednisone Teva 5 mg compresse viene usato nel trattamento di:

- Malattie reumatiche muscolari e articolari acute e croniche
- Asma bronchiale e fibrosi polmonare
- Colite ulcerosa (malattia infiammatoria intestinale)
- Epatite
- Malattia di Addison
- Sindrome adrenogenitale
- Malattie renali e delle vie urinarie
- Malattie allergiche e infiammatorie della pelle
- Anemia emolitica
- Agranulocitosi (carenza di globuli bianchi nel sangue)
- Porpora reumatica
- Leucemia acuta e altre malattie ematologiche
- Alcune malattie infiammatorie degli occhi (congiuntivite allergica, cheratite, corioretinite, irite, iridociclite)

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Prednisone Teva 5 mg compresse**

##### **Non prenda Prednisone Teva 5 mg compresse**

- se è allergico o ipersensibile al prednisone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
- in caso di malacia e osteoporosi
- se ha il diabete mellito
- se soffre di psicosi
- in caso di ulcera peptica
- nei casi di tubercolosi attiva (a meno che non vengano usati simultaneamente farmaci chemioterapici)
- nelle infezioni batteriche acute
- se soffre di varicella o di herpes
- in caso di infezioni sistemiche indotte da funghi
- se deve essere vaccinato, non prenda prednisone per le 8 settimane precedenti la vaccinazione e per le 2 settimane successive alla vaccinazione

- in caso di grave ipertensione arteriosa
- se soffre di glaucoma

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Prednisone Teva 5 mg compresse.

- Se presenta i seguenti fattori di rischio per l'osteoporosi: predisposizione familiare, invecchiamento, post-menopausa, fumo e attività fisica non significativa, poiché il trattamento con prednisone può indurre perdita di tessuto osseo
- Nel trattamento prolungato con prednisone, il medico può prescrivere integratori di potassio e suggerirle una riduzione nel consumo di sodio
- In caso di grave insufficienza cardiaca deve essere eseguito un attento controllo medico
- In caso di scarsa funzione della tiroide (ipotiroidismo) o di cirrosi epatica potrebbero essere sufficienti dosi più basse di quelle raccomandate
- Dopo un lungo periodo di trattamento, se ha bisogno di sospendere o interrompere il trattamento con prednisone, potrebbe avere una ricaduta della malattia di base, un'insufficienza acuta della corteccia surrenale (in particolare se ha un'infezione o dopo un incidente), oppure una sindrome da astinenza da cortisone
- La varicella o il morbillo potrebbero essere particolarmente gravi in pazienti trattati con glucocorticoidi. Ciò deve essere preso in considerazione in particolare nei bambini con difese immunitarie ridotte e negli adulti che non hanno mai sofferto di morbillo o varicella
- Nei bambini il trattamento prolungato può indurre danno al pancreas
- Il prodotto contiene un componente che può dare positività ai controlli antidoping.
- Il prednisone può alterare i risultati dei test allergici della pelle

### **Altri medicinali e Prednisone Teva 5 mg compresse**

Riferisca al medico se sta assumendo o se di recente ha assunto altri medicinali, inclusi medicinali ottenuti senza prescrizione medica.

- Rifampicina, fenitoina, carbamazepina e barbiturici possono ridurre l'effetto del prednisone. L'eritromicina e il chetoconazolo possono aumentarlo.
- I contraccettivi che contengono estrogeni possono aumentare l'effetto del prednisone
- Antiacidi (alluminio, magnesio) possono ridurre l'assorbimento e pertanto possono ridurre l'efficacia di prednisone
- Se prednisone viene assunto contemporaneamente con farmaci per trattare il diabete, l'effetto di questi ultimi sui livelli di zucchero nel sangue può essere più basso
- Se assume derivati della cumarina (medicinali per controllare la coagulazione del sangue), la somministrazione di prednisone può ridurre il loro effetto anticoagulante
- Se assume contemporaneamente prednisone e agenti digitalici, diuretici o amfotericina B, i livelli di potassio possono essere alterati
- Se assume prednisone e farmaci antinfiammatori non steroidei o agenti antireumatici (indometacina, acido acetilsalicilico) può aumentare il rischio di sanguinamento gastrointestinale
- Gli effetti di medicinali che rilassano i muscoli possono aumentare se questi vengono assunti in associazione con prednisone
- Prednisone non deve essere assunto in associazione con ciclosporina poiché la loro attività viene reciprocamente inibita
- Prednisone può alterare l'effetto della ciclofosfamida, se assunto contemporaneamente,

Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Prednisone Teva e il medico potrebbe volerla tenere sotto stretta osservazione se sta assumendo questi medicinali (compresi alcuni medicinali per il trattamento dell'HIV: ritonavir, cobicistat).

### **Gravidanza e allattamento**

**Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.**

Non deve assumere Prednisone Teva 5 mg compresse durante la gravidanza a meno che non le sia stato prescritto dal medico.

Se durante il trattamento si verificano i sintomi di malattie ad insorgenza acuta, quali malattie infettive, malattie digestive o alterazioni psichiatriche, si rivolga al medico.

L'assunzione di prednisone non è raccomandata durante l'allattamento a meno che non sia prescritto dal medico. Il medico le dirà se sospendere l'allattamento al seno o interrompere il trattamento con prednisone.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Si deve tenere in considerazione che i trattamenti a lungo termine possono ridurre l'acuità visiva, il che potrebbe avere effetti negativi sulla capacità di guidare con sicurezza nel traffico.

Prednisone Teva 5 mg compresse contiene lattosio.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **Uso negli atleti**

Si noti che il prodotto contiene un componente che può dare positività ai controlli antidoping.

## **3. Come prendere Prednisone Teva 5 mg compresse**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Si ricordi di prendere la dose.

Le compresse devono essere prese intere con una sufficiente quantità di liquido. La dose giornaliera totale va divisa in tre o quattro somministrazioni, durante o dopo i pasti. In alcuni casi la dose prescritta può essere presa in un'unica dose giornaliera, durante o dopo colazione. A volte, in particolare nei bambini, e solo se consigliato dal medico, il trattamento deve essere assunto a giorni alterni.

Il medico deciderà la dose che sarà più adatta alle sue necessità.

Prednisone Teva 5 mg compresse non deve essere sospeso bruscamente, il dosaggio, anzi, deve essere ridotto progressivamente.

In generale, la dose di mantenimento deve essere sempre la più bassa possibile.

Il medico le dirà la durata del trattamento con Prednisone Teva 5 mg compresse.

Non interrompa il trattamento bruscamente o prima della data prevista; ciò potrebbe peggiorare la sua condizione. Se le sembra che l'effetto di Prednisone Teva 5 mg compresse sia troppo forte o troppo debole, ne parli con il medico.

La dose raccomandata è:

### **Adulti**

La dose del trattamento dipenderà dal tipo e dalla gravità della malattia e dalla risposta individuale del paziente. Di solito, la dose iniziale è di 20-90 mg (milligrammi) al giorno, come prescritto dal medico. Queste dosi iniziali saranno somministrate fino a che non si osserva una risposta soddisfacente. Una volta ottenuta questa risposta, il medico ridurrà gradualmente la dose di prednisone fino a raggiungere la dose di mantenimento, che di solito varia tra 5 e 10 mg al giorno.

Nell'asma bronchiale, si procede in maniera identica ma la dose iniziale nei casi gravi è tra 15 e 60 mg.

Nel caso di trattamenti adiuvanti al trapianto d'organo, le dosi giornaliere raccomandate potrebbero variare, a seconda dell'organo interessato, tra 30 e 300 mg.

### **Bambini**

In generale, il trattamento con prednisone nei bambini può essere somministrato a giorni alterni o in maniera intermittente. Le dosi iniziali raccomandate sono di 1-3 mg di prednisone per chilo di peso corporeo al giorno. La dose di mantenimento è di 0,25 mg di prednisone/kg di peso corporeo/giorno.

#### **Se prende più Prednisone Teva 5 mg compresse di quanto deve**

Non sono noti casi di intossicazione acuta con prednisone. In caso di sovradosaggio, si prevede l'insorgenza delle reazioni avverse descritte in questo foglio illustrativo, ma di maggiore intensità. Il sovradosaggio può indurre eccitazione, ansia, depressione, confusione mentale, sanguinamento gastrointestinale, aumento della pressione sanguigna e dei livelli di zucchero nel sangue, nonché ritenzione di liquidi (edema).

In caso di sovradosaggio o di ingestione accidentale, consultare immediatamente il medico o il farmacista.

#### **Se dimentica di prendere Prednisone Teva 5 mg compresse**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Attenda la dose successiva e segua il trattamento normalmente.

#### **Se interrompe il trattamento con Prednisone Teva 5 mg compresse**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

- Nei trattamenti a lungo termine, obesità dell'addome e del volto ("faccia a luna piena"), aumento degli zuccheri nel sangue, perdita di tessuto osseo (osteoporosi), aumento della pressione del sangue, crescita di peli, acne, soppressione delle mestruazioni, impotenza sessuale negli uomini e ritardo nella crescita.
- Glaucoma, cataratta
- Eccitabilità, irritabilità e aumento dell'appetito
- Atrofia e dolorabilità muscolare
- Ulcere gastriche e duodenali e sanguinamento gastrointestinale
- Ritardo nella guarigione delle ferite, smagliature
- Le infezioni possono essere mascherate e il paziente può essere più vulnerabile ad esse
- Alterazioni del sangue: riduzione dei globuli bianchi o aumento dei globuli rossi.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Prednisone Teva 5 mg compresse**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Prednisone Teva 5 mg compresse**

- Il principio attivo è prednisone. Ogni compressa contiene 5 mg di prednisone.
- Gli altri componenti (eccipienti) sono: lattosio monoidrato, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato, silice colloidale anidra e talco.

### **Descrizione dell'aspetto di Prednisone Teva 5 mg compresse e contenuto della confezione**

Compresse cilindriche, bianche, con una linea di frattura su un lato e con impressa la scritta "PD5" sul lato di colore bianco della compressa. La linea di frattura non consente la divisione della compresse in due dosi uguali.

Le compresse di Prednisone Teva 5 mg sono confezionate in blister in PVC-PVDC/alluminio, Le compresse di Prednisone Teva 5 mg si presentano in confezioni contenenti 10, 20 e 30 compresse.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Teva Italia S.r.l  
Piazzale Luigi Cadorna, 4  
20123 - Milano  
Italia

*Produttore*

CYNDEA PHARMA S.L.  
Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz  
Avenida de Ágrede, 36  
42110 Ólvega  
(Soria) Spagna

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato**

### **Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

#### **Prednisone Teva 25 mg compresse** Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Prednisone Teva 25 mg compresse e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Prednisone Teva 25 mg compresse
3. Come prendere Prednisone Teva 25 mg compresse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Prednisone Teva 25 mg compresse
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Che cos'è Prednisone Teva 25 mg compresse e a cosa serve**

Il prednisone è un corticosteroide (glucocorticoide) derivato dal cortisone. E' coinvolto nella regolazione di molti processi metabolici dell'organismo.

Prednisone Teva 25 mg compresse viene usato nel trattamento di:

- Malattie reumatiche muscolari e articolari acute e croniche
- Asma bronchiale e fibrosi polmonare
- Colite ulcerosa (malattia infiammatoria intestinale)
- Epatite
- Malattia di Addison
- Sindrome adrenogenitale
- Malattie renali e delle vie urinarie
- Malattie allergiche e infiammatorie della pelle
- Anemia emolitica
- Agranulocitosi (carenza di globuli bianchi nel sangue)
- Porpora reumatica
- Leucemia acuta e altre malattie ematologiche
- Alcune malattie infiammatorie degli occhi (congiuntivite allergica, cheratite, chorioretinite, irite, iridociclite)
- Come coadiuvante nella terapia per il trapianto d'organo.

### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Prednisone Teva 25 mg compresse**

#### **Non prenda Prednisone Teva 25 mg compresse**

- se è allergico o ipersensibile al prednisone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
- in caso di malacia e osteoporosi
- se ha il diabete mellito
- se soffre di psicosi
- in caso di ulcera peptica
- nei casi di tubercolosi attiva (a meno che non vengano usati simultaneamente farmaci chemioterapici)
- nelle infezioni batteriche acute
- se soffre di varicella o di herpes
- in caso di infezioni sistemiche indotte da funghi
- se deve essere vaccinato, non prenda prednisone per le 8 settimane precedenti la vaccinazione e per le 2 settimane successive alla vaccinazione
- in caso di grave ipertensione arteriosa
- se soffre di glaucoma

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Prednisone Teva 25 mg compresse.

- Se presenta i seguenti fattori di rischio per l'osteoporosi: predisposizione familiare, invecchiamento, post-menopausa, fumo e attività fisica non significativa, poiché il trattamento con prednisone può indurre perdita di tessuto osseo
- Nel trattamento prolungato con prednisone, il medico può prescrivere integratori di potassio e suggerirle una riduzione nel consumo di sodio
- In caso di grave insufficienza cardiaca deve essere eseguito un attento controllo medico
- In caso di scarsa funzione della tiroide (ipotiroidismo) o di cirrosi epatica potrebbero essere sufficienti dosi più basse di quelle raccomandate

- Dopo un lungo periodo di trattamento, se ha bisogno di sospendere o interrompere il trattamento con prednisone, potrebbe avere una ricaduta della malattia di base, un'insufficienza acuta della corteccia surrenale (in particolare se ha un'infezione o dopo un incidente), oppure una sindrome da astinenza da cortisone
- La varicella o il morbillo potrebbero essere particolarmente gravi in pazienti trattati con glucocorticoidi. Ciò deve essere preso in considerazione in particolare nei bambini con difese immunitarie ridotte e negli adulti che non hanno mai sofferto di morbillo o varicella
- Nei bambini il trattamento prolungato può indurre danno al pancreas
- Il prodotto contiene un componente che può dare positività ai controlli antidoping.
- Il prednisone può alterare i risultati dei test allergici della pelle

### **Altri medicinali e Prednisone Teva 25 mg compresse**

Riferisca al medico se sta assumendo o se di recente ha assunto altri medicinali, inclusi medicinali ottenuti senza prescrizione medica.

- Rifampicina, fenitoina, carbamazepina e barbiturici possono ridurre l'effetto del prednisone. L'eritromicina e il chetoconazolo possono aumentarlo.
- I contraccettivi che contengono estrogeni possono aumentare l'effetto del prednisone
- Antiacidi (alluminio, magnesio) possono ridurre l'assorbimento e pertanto possono ridurre l'efficacia di prednisone
- Se prednisone viene assunto contemporaneamente con farmaci per trattare il diabete, l'effetto di questi ultimi sui livelli di zucchero nel sangue può essere più basso
- Se assume derivati della cumarina (medicinali per controllare la coagulazione del sangue), la somministrazione di prednisone può ridurre il loro effetto anticoagulante
- Se assume contemporaneamente prednisone e agenti digitalici, diuretici o amfotericina B, i livelli di potassio possono essere alterati
- Se assume prednisone e farmaci antinfiammatori non steroidei o agenti antireumatici (indometacina, acido acetilsalicilico) può aumentare il rischio di sanguinamento gastrointestinale
- Gli effetti di medicinali che rilassano i muscoli possono aumentare se questi vengono assunti in associazione con prednisone
- Prednisone non deve essere assunto in associazione con ciclosporina poiché la loro attività viene reciprocamente inibita
- Prednisone può alterare l'effetto della ciclofosfamida, se assunto contemporaneamente.

Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Prednisone Teva e il medico potrebbe volerla tenere sotto stretta osservazione se sta assumendo questi medicinali (compresi alcuni medicinali per il trattamento dell'HIV: ritonavir, cobicistat).

### **Gravidanza e allattamento**

**Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.**

Non deve assumere Prednisone Teva 25 mg compresse durante la gravidanza a meno che non le sia stato prescritto dal medico.

Se durante il trattamento si verificano i sintomi di malattie ad insorgenza acuta, quali malattie infettive, malattie digestive o alterazioni psichiatriche, si rivolga al medico.

L'assunzione di prednisone non è raccomandata durante l'allattamento a meno che non sia prescritto dal medico. Il medico le dirà se sospendere l'allattamento al seno o interrompere il trattamento con prednisone.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Si deve tenere in considerazione che i trattamenti a lungo termine possono ridurre l'acuità visiva, il che potrebbe avere effetti negativi sulla capacità di guidare con sicurezza nel traffico.

Prednisone Teva 25 mg compresse contiene lattosio.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **Uso negli atleti**

Si noti che il prodotto contiene un componente che può dare positività ai controlli antidoping.

### **3. Come prendere Prednisone Teva 25 mg compresse**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Si ricordi di prendere la dose.

Le compresse devono essere prese intere con una sufficiente quantità di liquido. La dose giornaliera totale va divisa in tre o quattro somministrazioni, durante o dopo i pasti. In alcuni casi la dose prescritta può essere presa in un'unica dose giornaliera, durante o dopo colazione. A volte, in particolare nei bambini, e solo se consigliato dal medico, il trattamento deve essere assunto a giorni alterni.

Il medico deciderà la dose che sarà più adatta alle sue necessità.

Prednisone Teva 25 mg compresse non deve essere sospeso bruscamente, il dosaggio, anzi, deve essere ridotto progressivamente.

In generale, la dose di mantenimento deve essere sempre la più bassa possibile.

Il medico le dirà la durata del trattamento con Prednisone Teva 25 mg compresse.

Non interrompa il trattamento bruscamente o prima della data prevista; ciò potrebbe peggiorare la sua condizione. Se le sembra che l'effetto di Prednisone Teva 25 mg compresse sia troppo forte o troppo debole, ne parli con il medico.

La dose raccomandata è:

#### **Adulti**

La dose del trattamento dipenderà dal tipo e dalla gravità della malattia e dalla risposta individuale del paziente. Di solito, la dose iniziale è di 20-90 mg (milligrammi) al giorno, come prescritto dal medico. Queste dosi iniziali saranno somministrate fino a che non si osserva una risposta soddisfacente. Una volta ottenuta questa risposta, il medico ridurrà gradualmente la dose di prednisone fino a raggiungere la dose di mantenimento, che di solito varia tra 5 e 10 mg al giorno.

Nell'asma bronchiale, si procede in maniera identica ma la dose iniziale nei casi gravi è tra 15 e 60 mg.

Nel caso di trattamenti adiuvanti al trapianto d'organo, le dosi giornaliere raccomandate potrebbero variare, a seconda dell'organo interessato, tra 30 e 300 mg.

#### **Bambini**

In generale, il trattamento con prednisone nei bambini può essere somministrato a giorni alterni o in maniera intermittente. Le dosi iniziali raccomandate sono di 1-3 mg di prednisone per chilo di peso corporeo al giorno. La dose di mantenimento è di 0,25 mg di prednisone/kg di peso corporeo/giorno.

#### **Se prende più Prednisone Teva 25 mg compresse di quanto deve**

Non sono noti casi di intossicazione acuta con prednisone. In caso di sovradosaggio, si prevede l'insorgenza delle reazioni avverse descritte in questo foglio illustrativo, ma di maggiore intensità. Il sovradosaggio può indurre eccitazione, ansia, depressione, confusione mentale, sanguinamento gastrointestinale, aumento della pressione sanguigna e dei livelli di zucchero nel sangue, nonché ritenzione di liquidi (edema).

In caso di sovradosaggio o di ingestione accidentale, consultare immediatamente il medico o il farmacista.

#### **Se dimentica di prendere Prednisone Teva 25 mg compresse**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Attenda la dose successiva e segua il trattamento normalmente.

#### **Se interrompe il trattamento con Prednisone Teva 25 mg compresse**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

- Nei trattamenti a lungo termine, obesità dell'addome e del volto ( "faccia a luna piena"), aumento degli zuccheri nel sangue, perdita di tessuto osseo (osteoporosi), aumento della pressione del sangue, crescita di peli, acne, soppressione delle mestruazioni, impotenza sessuale negli uomini e ritardo nella crescita.
- Glaucoma, cataratta
- Eccitabilità, irritabilità e aumento dell'appetito
- Atrofia e dolorabilità muscolare
- Ulcere gastriche e duodenali e sanguinamento gastrointestinale
- Ritardo nella guarigione delle ferite, smagliature
- Le infezioni possono essere mascherate e il paziente può essere più vulnerabile ad esse
- Alterazioni del sangue: riduzione dei globuli bianchi o aumento dei globuli rossi.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Prednisone Teva 25 mg compresse**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene Prednisone Teva 25 mg compresse**

- Il principio attivo è prednisone. Ogni compressa contiene 25 mg di prednisone.
- Gli altri componenti (eccipienti) sono: lattosio monoidrato, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato, silice colloidale anidra e talco.

##### **Descrizione dell'aspetto di Prednisone Teva 25 mg compresse e contenuto della confezione**

Compresse oblunghe, bianche.

Le compresse di Prednisone Teva 25 mg sono confezionate in blister in PVC-PVDC/alluminio, Le compresse di Prednisone Teva 25 mg si presentano in confezioni contenenti 10 compresse.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Teva Italia S.r.l  
Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 - Milano  
Italia

*Produttore*

CYNDEA PHARMA S.L.  
Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz  
Avenida de Ágreda, 36  
42110 Ólvega  
(Soria) Spagna

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato**

Agenzia Italiana del Farmaco