

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

BECLOMETASONE DOC 0,025% crema

Beclometasone

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BECLOMETASONE DOC e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare BECLOMETASONE DOC
3. Come usare BECLOMETASONE DOC
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BECLOMETASONE DOC
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è BECLOMETASONE DOC e a che cosa serve

BECLOMETASONE DOC è una crema da applicare sulla pelle che contiene il principio attivo beclometasone appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati corticosteroidi, utilizzati per alleviare le infiammazioni e le allergie.

BECLOMETASONE DOC è indicato per il trattamento delle irritazioni della pelle di tipo allergico o infiammatorio quali:

- irritazioni della pelle da cause esterne come dermatiti da contatto o irritazioni professionali;
- reazioni della pelle causate da farmaci o da alimenti (tossicodermia);
- reazioni infiammatorie della pelle (eczema) di vario tipo (idiopatico, allergico, da stasi, crosta latte);
- prurito all'ano (anale) e ai genitali femminili (vulvare) e prurito che si manifesta senza una causa certa (essenziale);
- altre forme di irritazioni della pelle come dermatite da radiazioni, scottature o eritema solare causate da una prolungata esposizione alla luce del sole;
- dermatite atopica (neurodermatite);
- lichen ruber planus, una malattia della pelle e delle mucose caratterizzata da arrossamenti e lesioni;
- eruzione cutanea con bruciore (orticaria);
- irritazione della pelle causata da una continua frizione di due parti del corpo (intertrigo, eritema intertriginoso ano-genitale dei lattanti);
- dermatite seborroica, che interessa zone ricche di ghiandole sebacee come cuoio capelluto, viso, torace;
- lupus eritematoso, una malattia cronica autoimmune caratterizzata da lesioni della pelle;
- psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che coinvolge il sistema immunitario;
- acne volgare, un'infiammazione cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di brufoli e punti neri.

2. Cosa deve sapere prima di usare BECLOMETASONE DOC

Non usi BECLOMETASONE DOC

- se è allergico al beclometasone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è affetto da un tipo di infezione della pelle chiamata tubercolosi cutanea;
- se ha un'infezione della pelle causata da virus.

Non applichi il bendaggio occlusivo se è affetto da dermatite atopica (Vedere paragrafo 3).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare BECLOMETASONE DOC.

BECLOMETASONE DOC non va applicato sugli occhi.

Se presenta delle infezioni della pelle, usi questo medicinale assieme ad un altro medicinale contro i funghi (antifungino) o i batteri (antibatterico), se non nota miglioramenti, interrompa il trattamento con questo medicinale.

Eviti il trattamento per lunghi periodi e ad alte dosi perché può causare un'irritazione o una reazione allergica (sensibilizzazione), o può verificarsi un assorbimento attraverso la pelle. L'uso, soprattutto ad alte dosi, deve essere evitato in condizioni che favoriscono l'assorbimento come ustioni o lesioni varicose (ulcere trofiche).

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Altri medicinali e BECLOMETASONE DOC

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza, usi questo medicinale soltanto in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non ci sono dati disponibili per stabilire l'effetto del medicinale sulla capacità di guida e sull'utilizzo di macchinari.

BECLOMETASONE DOC contiene clorocresolo, alcool cetostearilico e glicole propilenico

Questo medicinale contiene clorocresolo che può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene alcool cetostearilico che può provocare reazioni cutanee locali (per esempio dermatite da contatto).

Questo medicinale contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.

3. Come usare BECLOMETASONE DOC

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, chiedi al medico o al farmacista.

BECLOMETASONE DOC non va applicato sugli occhi.

Applichi una piccola quantità di crema sulla zona interessata, dopo averla opportunamente pulita, e massaggi dolcemente per favorirne l'assorbimento.

Il trattamento iniziale prevede 2 applicazioni al giorno, che potrà ridurre gradualmente in seguito ad un miglioramento delle sue condizioni.

In alcuni casi gravi si può ricorrere al bendaggio oclusivo per ottenere una migliore risposta alla terapia. In questi casi sarà il medico ad indicarle se deve applicare un bendaggio oclusivo e le indicherà anche per quanto tempo deve mantenerlo e se è necessario ripetere l'applicazione più volte.

Applichi il bendaggio oclusivo nel seguente modo:

- 1) applicare uno spesso strato di crema sull'intera superficie della lesione sotto una leggera garza e coprire con materiale plastico impermeabile e flessibile, oltre i bordi della zona trattata;
- 2) sigillare i bordi sulla pelle sana con cerotto o altri mezzi;

Eviti di applicare il bendaggio oclusivo su zone estese e con lesioni poiché può favorire l'assorbimento sistemico dei corticosteroidi e la comparsa di effetti indesiderati. Se nota un'irritazione della pelle, rimuova la copertura plastica.

Se usa più BECLOMETASONE DOC di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di BECLOMETASONE DOC contatti immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono stati descritti casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È improbabile che si manifestino effetti indesiderati sistemici con i dosaggi di medicinale raccomandato, tuttavia durante l'impiego di corticosteroidi sulla pelle mediante il bendaggio oclusivo o per trattamenti intensi e per lunghi periodi di tempo, possono comparire effetti indesiderati.

Inoltre, localmente possono comparire:

- bruciore, irritazione e secchezza della pelle;
- infiammazione dei follicoli piliferi (follicolite);
- irritazione con brufoli (eruzioni acneiche);
- aumento della crescita dei peli (ipertricosi);
- ridotta colorazione della pelle (ipopigmentazione);
- assottigliamento della pelle (atrofia cutanea).

Può manifestarsi visione offuscata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati, lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare BECLOMETASONE DOC

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scad”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene BECLOMETASONE DOC

- Il principio attivo è beclometasone. Ogni 100 g di crema contengono 0,025 g di beclometasone-17,21-dipropionato.
- Gli altri componenti sono: glicerolo, glicole propilenico, alcool cetostearilico, esteri poliglicolici di acidi grassi, clorocresolo, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di BECLOMETASONE DOC e contenuto della confezione

Confezione contenente un tubo da 30 g di crema.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio

DOC Generici S.r.l. – Via Turati, 40 – 20121 Milano – Italia

Produttore

DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. - Via Martiri delle Foibe,1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: