

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

SUCRALFATO DOC Generici 2 g granulato per sospensione orale Sucralfato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è SUCRALFATO DOC Generici e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere SUCRALFATO DOC Generici
3. Come prendere SUCRALFATO DOC Generici
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SUCRALFATO DOC Generici
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è SUCRALFATO DOC Generici e a cosa serve

SUCRALFATO DOC Generici contiene il principio attivo sucralfato, che appartiene alla categoria dei medicinali utilizzati per il trattamento dell'ulcera. Agisce formando una barriera protettiva sulle lesioni prevenendo ulteriori irritazioni causate dagli acidi prodotti nello stomaco.

Questo medicinale viene utilizzato per il trattamento di:

- lesioni allo stomaco (ulcera gastrica), e lesioni all'intestino (ulcera duodenale);
- infiammazione dello stomaco come manifestazione transitoria o permanente (gastrite acuta e gastrite cronica);
- disturbi allo stomaco dovuti all'uso di medicinali antinfiammatori appartenenti alla categoria dei FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei);
- infiammazione dell'esofago dovuta alla risalita di liquidi e/o cibi acidi (esofagite da reflusso).

2. Cosa deve sapere prima di prendere SUCRALFATO DOC Generici

Non prenda SUCRALFATO DOC Generici

- se è allergico al sucralfato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);

- se soffre di fenilchetonuria, una condizione in cui si hanno elevati livelli di piruvato nelle urine e di fenilalanina nel sangue, in quanto questo medicinale contiene aspartame;
- se il paziente è un neonato prematuro.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere SUCRALFATO DOC Generici.

Informi il medico ed usi questo medicinale con cautela evitando trattamenti prolungati nei seguenti casi:

- se soffre di problemi ai reni gravi (insufficienza renale);
- se si sottopone ad emodialisi (filtrazione meccanica del sangue);
- se soffre di disturbi nel movimento dei cibi nel tratto digerente, in quanto possono formarsi degli accumuli di materiale non digerito (bezoari).

Bambini e adolescenti

SUCRALFATO DOC Generici non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 14 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza ed efficacia di questo medicinale.

Altri medicinali e SUCRALFATO DOC Generici

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Il sucralfato può modificare l'effetto di alcuni farmaci tra cui:

- tetracicline, ciprofloxacina e norfloxacina, medicinali utilizzati per il trattamento di infezioni batteriche;
- ketoconazolo, utilizzato per il trattamento di infezioni da funghi;
- cimetidina e ranitidina, medicinali utilizzati nel trattamento di disturbi allo stomaco quali gastriti e ulcere;
- digossina, un medicinale utilizzato nel trattamento di disturbi al cuore;
- fenitoina, un medicinale utilizzato in caso di epilessia;
- teofillina, un medicinale utilizzato nel trattamento di disturbi respiratori come l'asma bronchiale.

Pertanto, se deve assumere i medicinali sopraelencati lo faccia almeno due ore prima o dopo l'assunzione di SUCRALFATO DOC Generici.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza o se sta allattando con latte materno usi questo medicinale soltanto in casi di effettiva necessità e sotto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guida di veicoli e dell'utilizzo di macchinari.

SUCRALFATO DOC Generici contiene aspartame e sorbitolo

Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria (vedere il paragrafo “Non prenda SUCRALFATO DOC Generici”).

Questo medicinale contiene sorbitolo, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere SUCRALFATO DOC Generici

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di una bustina di granulato 2 volte al giorno, salvo diversa prescrizione medica.

Prenda il medicinale a stomaco vuoto, dopo aver sciolto il granulato in un poco di acqua.

Se prende più SUCRALFATO DOC Generici di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di SUCRALFATO DOC Generici avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere SUCRALFATO DOC Generici

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

- formazione di accumuli di materiale non digerito (bezoari).
- diarrea, flatulenza, nausea, vomito, senso di pienezza gastrica;
- stitichezza, in seguito a trattamenti prolungati;
- secchezza della bocca;
- eruzione cutanea e prurito;
- vertigini;
- insonnia;
- mal di testa (cefalea);
- dolori lombari;
- reazioni di tipo allergico, tra cui irritazioni della pelle (orticaria), gonfiore specialmente intorno a bocca e occhi (angioedema), difficoltà respiratorie e raffreddore allergico (rinite).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti

indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SUCRALFATO DOC Generici

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al medicinale correttamente conservato.

Conservi questo medicinale ad una temperatura inferiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SUCRALFATO DOC Generici

- Il principio attivo è sucralfato. Ogni bustina contiene 2 g di sucralfato.
- Gli altri componenti sono sorbitolo, aspartame e aroma arancia.

Descrizione dell'aspetto di SUCRALFATO DOC Generici e contenuto della confezione

Confezione da 30 bustine di granulato.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

DOC Generici Generici Srl - Via Turati 40 - 20121 Milano

Produttore

Special Product's Line S.r.l. Via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (RM).
LA.FA.RE. S.r.l. - Via Sac. Benedetto Cozzolino 77 - 80056 Ercolano (NA)

Ripartizione granulato e confezionamento terminale:

Lamp S. Prospero S.p.A. Via della Pace, 25/A - 41030 S. Prospero S/Secchia (MO).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il