

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici 20 mg/40 mg compresse

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici
3. Come usare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici e a cosa serve

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici contiene due principi attivi. Uno è la cinnarizina e l'altro è il dimenidrinato. Le due sostanze appartengono a differenti gruppi di medicinali. La cinnarizina appartiene al gruppo dei calcioantagonisti, mentre il dimenidrinato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antistaminici.

Entrambe le sostanze agiscono riducendo i sintomi delle vertigini (una sensazione di capogiro o di giramento di testa) e della nausea (malessere). Quando queste due sostanze sono utilizzate in associazione, queste sono più efficaci rispetto al singolo utilizzo di ciascuna di esse.

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici è usato per il trattamento di vari tipi di vertigini negli adulti. Le vertigini possono avere un numero di differenti cause. L'uso di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può aiutare a svolgere le attività quotidiane rese difficili dalla presenza di vertigini.

2. Cosa deve sapere prima di usare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Non prenda CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici:

- se ha un'età inferiore a 18 anni

- se è allergico alla cinnarizina, al dimenidrinato o alla difenidramina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è allergico a qualsiasi altro antistaminico (come l'astemizolo, la clorfeniramina e la terfenadina, impiegati come medicinali antiallergici). Non deve assumere questo medicinale a meno che non le sia stato prescritto dal medico
- se soffre di glaucoma ad angolo chiuso (un tipo particolare di malattia dell'occhio)
- se è affetto da epilessia
- se presenta un aumento della pressione all'interno del cervello (ad es. a causa di un tumore)
- se ha problemi di abuso d'alcol
- se ha problemi prostatici che le provocano difficoltà nell'urinare
- se ha un'insufficienza epatica o renale.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici se soffre di:

- pressione del sangue alta o bassa
- pressione oculare alta
- occlusione intestinale
- ingrossamento della prostata
- tiroide iperattiva
- gravi problemi al cuore
- malattia di Parkinson.

L'uso di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può peggiorare queste condizioni. CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può comunque essere indicato per lei ma il medico deve tenere presente questi fattori.

Altri medicinali e CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può interagire con altri medicinali che sta assumendo.

L'assunzione di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici con i medicinali elencati di seguito può renderla stanco o assonnato:

- barbiturici (medicinali spesso assunti per indurre uno stato di calma)
- analgesici narcotici come la morfina (antidolorifici forti come la morfina)
- tranquillanti (un tipo di medicinali usati per il trattamento della depressione e dell'ansia)
- inibitori delle monoaminossidasi (usati per il trattamento della depressione e dell'ansia).

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può potenziare gli effetti dei seguenti medicinali:

- antidepressivi triciclici (usati per il trattamento della depressione e dell'ansia)
- atropina (un medicinale che rilassa i muscoli ed è spesso utilizzato negli esami dell'occhio)
- efedrina (può essere usata per il trattamento della tosse o del naso chiuso)
- procarbazine (un medicinale usato per il trattamento di alcuni tipi di cancro)

- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue.

Gli aminoglicosidi (un tipo di antibiotici) possono danneggiare l'orecchio interno. Se assume CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici, è possibile che non si accorga di tale danno.

Non deve prendere CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici con i farmaci usati per correggere i problemi del battito cardiaco (antiaritmici). CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può inoltre alterare la risposta della pelle ai test allergici.

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici con cibi, bevande e alcol

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può provocare indigestione, che può essere ridotta assumendo le compresse dopo i pasti. Non beva alcol durante il trattamento con CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici perchè può provocare stanchezza o sonnolenza.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Non prenda CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può provocare sonnolenza. In tal caso non deve guidare o utilizzare macchinari.

3. Come usare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Prenda sempre CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 compressa tre volte al dì, da assumersi dopo i pasti con un po' di liquido. Ingerisca la compressa intera senza masticarla.

Generalmente prenderà CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici al massimo per 4 settimane. Il medico le dirà se deve assumere CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici più a lungo

Se prende più CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici di quanto deve

Se assume accidentalmente troppe compresse o se un bambino ne ha ingerita qualcuna, consulti con urgenza un medico.

L'assunzione di una quantità eccessiva di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può farla sentire molto stanca, assonnata e instabile. Le pupille possono dilatarsi e può non riuscire a urinare. Può manifestare bocca secca, arrossamento del volto, accelerazione della frequenza cardiaca, febbre, sudorazione e cefalea.

Se assume una dose massiccia di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici può sviluppare convulsioni, allucinazioni, pressione sanguigna elevata, può sentirsi scosso, eccitato e avere difficoltà respiratorie. Può andare in coma.

Se dimentica di prendere CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Se dimentica di prendere una compressa di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici, deve saltare quella dose. Prenda la compressa successiva di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici all'orario abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Non interrompa l'assunzione con CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici prima che sia il suo medico a indicarglielo. Se interrompe il trattamento troppo presto, è probabile che i sintomi delle vertigini (sensazione di capogiro e di giramento di testa) tornino a manifestarsi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (interessano fino a 1 persona su 10):

- sonnolenza,
- bocca secca,
- mal di testa,
- mal di stomaco.

Questi sono solitamente di lieve entità e scompaiono nell'arco di alcuni giorni pur continuando il trattamento con CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici.

Effetti indesiderati non comuni (interessano fino a 1 persona su 100):

- sudorazione,
- arrossamento della pelle,
- indigestione,
- nausea (malessere),
- diarrea,
- nervosismo,
- crampi,
- dimenticanza,
- tinnito (ronzio nelle orecchie),
- parestesia (formicolio di mani e/o piedi),
- tremore (sensazione di tremare).

Effetti indesiderati rari (interessano fino a 1 persona su 1000):

- compromissione della vista,
- reazioni allergiche (es. reazioni della pelle),
- sensibilità alla luce,
- difficoltà nell'urinare.

Effetti indesiderati molto rari (interessano meno di 1 persona su 10.000):

- riduzione del numero dei globuli bianchi e delle piastrine,
- notevole riduzione del numero dei globuli rossi, che può causare debolezza, formazione di lividi o aumento della probabilità di sviluppare infezioni.

Se soffre di infezioni con febbre e grave peggioramento delle condizioni generali di salute, si rivolga al medico e lo informi del medicinale che sta assumendo.

Altre possibili reazioni (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) che possono verificarsi con questo tipo di medicinale comprendono:

- aumento di peso,
- stitichezza,
 - sensazione di oppressione toracica
- ittero (ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi dovuto a problemi del sangue o del fegato),
- peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso (una malattia degli occhi caratterizzata da un aumento della pressione all'interno dell'occhio),
- movimenti non controllati,
- eccitazione e irrequietezza insolite (in particolare nei bambini)
- gravi reazioni della pelle.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

- I principi attivi sono la cinnarizina e il dimenidrinato. Ogni compressa contiene 20 mg di cinnarizina e 40 mg di dimenidrinato.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, ipromellosa, croscarmellosa sodica, talco e magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici e contenuto della confezione

Le compresse di CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici sono di colore bianco di forma rotonda e convessa.

CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici è disponibile in confezioni da 20 o 50 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
DOC Generici S.r.l. - Via Turati 40 - 20121 Milano - Italia.

Produttori

- Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira - 2710-089 Sintra - Portogallo.
- West Pharma - Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A. - Rua João de Deus, n. 11, Venda Nova - 2700-486 Amadora - Portogallo.

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Italia: CINNARIZINA E DIMENIDRINATO DOC Generici

Portogallo: Cinarizina + Dimenidrinato Blixie

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in

Agenzia Italiana del Farmaco