

Foglio illustrativo

NEVACORT ovuli

#### IDENTIFICAZIONE DEL MEDICINALE

Denominazione: NEVACORT Ovuli

#### Composizione:

Ogni ovulo da 2,7 contiene:

#### Principi attivi:

Neomicina solfato g 0,100

Idrocortisone g 0,030

#### Eccipienti:

Gliceridi semisintetici

Forma farmaceutica: Ovuli per uso vaginale Confezione da 4 ovuli

#### Categoria farmacoterapeutica:

antinfettivo e antinfiammatorio vaginale. La neomicina, antibiotico a largo spettro risulta idonea a combattere la multiforme flora batterica che può presentarsi in particolari condizioni nell'ambiente vaginale.

L'idrocortisone esercita la sua azione sui processi infiammatori caratterizzati da intensa secrezione mucopurulenta complicati da fatti reattivi edematosi e da una componente pruriginosa spesso molesta.

#### Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Farmitalia S.r.l.

Viale Alcide De Gasperi 165/B Catania

#### Produttore: ECOBI SAS

Via Enrico Bazzano 26 Ronco Scrivia (GE)

#### Indicazioni terapeutiche:

Vaginiti batteriche sensibili alla neomicina accompagnate da fenomeni infiammatori con secrezione purulenta, edema e prurito.

#### INFORMAZIONI DA CONOSCERE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

#### Controindicazioni:

Ipersensibilità a neomicina e idrocortisone. Infezioni virali (herpes simplex) o micotiche della zona da trattare.

Precauzioni d'impiego: Nessuna

#### Interazioni con altri medicinali:

Non è stata descritta alcuna interazione con altri farmaci.

#### Avvertenze speciali:

L'uso prolungato o ripetuto del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione o a sviluppo di infezioni batteriche o micotiche non sensibili alla

neomicina, nonché a fenomeni di assorbimento sistemico dei componenti. E' consigliabile non superare i 5-7 giorni di terapia, passando poi , eventualmente , al componente ritenuto necessario. Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità , sotto il diretto controllo del medico.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA UTILIZZAZIONE Dose , modo e tempi di

somministrazione:

Introdurre in vagina 1-2 ovuli nella giornata e uno la sera prima di coricarsi , secondo consiglio del medico.

Nel periodo estivo è bene, prima di togliere l'ovulo dall 'involucro, immergere il contenitore in acqua fredda.

Effetti indesiderati:

Riportati localmente fenomeni di ipersensibilità (irritazione , bruciore , iperemia) e , per trattamenti iritensi e prolungati , atrofia della mucosa. Fenomeni dovuti ad abnorme assorbimento sistemico consistono in segni di oto-nefrotossicità per la neomicina ed astenia, adinamia, ipertensione arteriosa, ipopotassemia per l'idrocortisone. Ove ciò si verifichi , occorre interrompere il trattamento e adottare una terapia idonea.

Quando si osservano effetti collaterali dopo l'uso del prodotto , occorre interpellare il medico o il farmacista.

Data di scadenza:

Osservare la data di scadenza indicata sulla confezione. Il prodotto può essere conservato a temperatura ambiente. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata.

Tabella di appartenenza al DPR 309/90.

Non soggetto al DPR 309/90.

Revisione ministeriale del foglio illustrativo Febbraio 2005