

NEVACORT

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

ATC G01BA

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni ovulo contiene:

Idrocortisone 30 mg

Neomicina solfato 100 mg

Eccipienti:

Gliceridi semisintetici 2570 mg

FORMA FARMACEUTICA

Ovuli

PROPRIETA' FARMACOLOGICHE , TOSSICOLOGICHE ED ELEMENTI DI FARMACOCINETICA

Categoria farmaco-terapeutica

Antinfettivo ed antinfiammatorio vaginale. La neomicina , antibiotico a largo spettro risulta idonea a combattere la multiforme flora batterica che può presentarsi in particolari condizioni nell'ambiente vaginale. L'idrocortisone esercita la sua azione sui processi infiammatori caratterizzati da intensa secrezione muco-purulenta complicati da fatti reattivi edematosi e da una componente pruriginosa spesso molesta.

Farmacocinetica

Dopo la somministrazione orale si ha una elevatissima concentrazione di ambedue gli antibiotici nelle feci e con queste vengono eliminati , dato che il loro assorbimento intestinale è praticamente nullo.

INFORMAZIONI CLINICHE

Indicazioni terapeutiche

Vaginiti batteriche sensibili alla neomicina accompagnate da fenomeni infiammatori con secrezione purulenta , edema e prurito.

Controindicazioni

Ipersensibilità a neomicina o idrocortisone. infezioni virali (herpes simplex) o micotiche della zona da trattare.

Effetti indesiderati

Riportati localmente fenomeni di ipersensibilità (irritazione , bruciore , iperemia) e , per trattamenti intensi e prolungati , atrofia della mucosa. Fenomeni dovuti ad abnorme assorbimento sistemico consistono in segni di otonefrotossicità per la neomicina ed astenia , adinamia , ipertensione arteriosa , ipopotassemia per l'idrocortisone. Ove ciò si verifichi , occorre interrompere il trattamento ed adottare una terapia idonea. Quando si osservano effetti collaterali dopo l'uso del prodotto , occorre interpellare il medico o il farmacista.

Speciali precauzioni d'uso

Nessuna.

Interazioni

Non è stata descritta alcuna interazione con altri farmaci.

Posologia e modo di somministrazione

Introdurre in vagina 1-2 ovuli nella giornata e uno la sera prima di coricarsi , secondo consiglio del medico. Nel periodo estivo è bene , prima di togliere l'ovulo dall'involucro , immergere il contenitore in acqua fredda.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

Periodo di stabilità a confezionamento integro

24 mesi

Speciali precauzioni per la conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente.

Natura del contenitore , confezione

Astuccio di cartone contenente 4 ovuli

Sede sociale del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Farmitalia S.r.l., Viale A. De Gasperi 165/B Catania.

A.I.C. n° 14385013

Eventuale tabella di appartenenza secondo D.P.R. 309/90

Prodotto non soggetto al DPR 309/90

Regime di dispensazione

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

Data ultima revisione – Febbraio 2005.

Agenzia Italiana del Farmaco