

## FOGLIO ILLUSTRATIVO OVULI

### MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 U.I. ovuli nifuratel + nistatina

#### COMPOSIZIONE

**Ogni ovulo contiene:** nifuratel mg 500; nistatina U.I. 200.000;

**Eccipiente:** dimetilpolisilossano AK 1000;

**Componenti l'involucro gelatinoso:** gelatina; glicerina; sodio etil-4-idrossibenzoato; sodio propil-4-idrossibenzoato; titanio biossido; ferro ossido giallo.

#### FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

12 ovuli vaginali

#### CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Antiprotozario, antibatterico, antimicotico.

#### TITOLARE AIC

Farmitalia S.r.l.

Viale Alcide De Gasperi 165/B Catania

#### PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Officina di Quinto de' Stampi - Rozzano (MI)

e/o

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

#### INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia polivalente delle affezioni vulvovaginali da microorganismi patogeni: Candida, Trichomonas e batteri.

#### CONTROINDICAZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti ipersensibili alla nistatina e al nifuratel.

#### PRECAUZIONI PER L'USO

L'uso, specie se prolungato, del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Nel caso di comparsa di reazioni di ipersensibilità, la somministrazione del farmaco dovrà essere interrotta.

Durante il trattamento astenersi dai rapporti sessuali.

#### DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Un ovulo al giorno o secondo prescrizione medica.

Per ottenere il più favorevole risultato terapeutico, è necessario che gli ovuli vengano portati, con un dito, nella parte più alta della vagina.

#### EFFETTI INDESIDERATI

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati anche non descritti nel foglio illustrativo.

**ATTENZIONE:** Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.  
Tale data si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.  
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

**REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA  
DEL FARMACO**

Luglio 2009

Agenzia Italiana del Farmaco

## FOGLIO ILLUSTRATIVO CREMA

**MACMIROR COMPLEX**  
**10 g + 4.000.000 U.I. crema**  
**nifuratel + nistatina**

### COMPOSIZIONE

**100 g di crema contengono:** nifuratel g 10, nistatina 4.000.000 U.I.;

**Eccipienti:** xalifin 15; metile p-idrossibenzoato; propile p-idrossibenzoato; glicerina; sorbitolo 70%; glicole propilenico; carbomer; trietanolamina 30% p/v; acqua deionizzata.

### FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

30 g crema vaginale (con 6 applicatori)

### CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Antiprotozario, antibatterico, antimicotico.

### TITOLARE AIC

Farmitalia S.r.l.

Viale Alcide De Gasperi 165/B Catania

### PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Prodotto, confezionato e controllato da:

Doppel Farmaceutici S.r.l

Via Martiri delle Foibe, 1 – Cortemaggiore (PC)

### INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia polivalente delle affezioni vulvovaginali da microorganismi patogeni: Candida, Trichomonas e batteri.

### CONTROINDICAZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti ipersensibili alla nistatina e al nifuratel.

### PRECAUZIONI PER L'USO

L'uso, specie se prolungato, del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Nel caso di comparsa di reazioni di ipersensibilità, la somministrazione del farmaco dovrà essere interrotta.

Durante il trattamento astenersi dai rapporti sessuali.

### DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare 2,5 g di crema una o due volte al giorno, alla sera e/o al mattino, secondo prescrizione medica.

La dose necessaria di crema sarà applicata con l'applicatore.

### EFFETTI INDESIDERATI

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati anche non descritti nel foglio illustrativo.

**ATTENZIONE:** Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

**REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Settembre 2007

**Istruzioni per l'uso**

Avvitare l'applicatore sul tubo di crema (fig. 1), premere quest'ultimo fino ad introdurre nell'applicatore la quantità di crema richiesta (fig. 2).

Svitare l'applicatore dal tubo ed introdurlo in vagina premendo lo stantuffo (fig. 3).

Ciascun applicatore non deve essere utilizzato per più di due applicazioni di crema.

Agenzia Italiana del Farmaco