

PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO
ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

AMUKINE MED 0,05% SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE
Sodio ipoclorito

CHE COS'È

AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo, soluzione è un disinfettante per uso topico dermatologico.

PERCHÉ SI USA

AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo, soluzione si usa nei seguenti casi:

- disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.),
- disinfezione dei genitali esterni.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce l'attività dell'antisettico.

L'applicazione topica del prodotto può dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamento.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talora fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo, soluzione può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non pertinente

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Ripetere le applicazioni secondo necessità. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. Attenzione: non superare le dosi indicate.

Quando e per quanto tempo

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come

AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo è pronto all'uso. Applicare lo spray localmente:

- direttamente sull'area da trattare,
- su compresse di garza,
- su bendaggi.

Si applica direttamente su ferite, piaghe, ustioni. Erogare lo spray fino a inumidire uniformemente l'area da trattare. Una singola erogazione equivale a 0,7 ml di soluzione.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale di AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Amukine Med, rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Amukine Med può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute: è possibile il verificarsi, in qualche caso, d'intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Conservare il flacone in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

Reinserire il cappuccio di protezione sull'erogatore dopo ogni uso.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 ml contengono: principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g); eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

AMUKINE MED 0,05% spray cutaneo soluzione si presenta in forma di soluzione per uso esterno, che viene erogata attraverso un dispositivo spray. Il contenuto della confezione è di 200 ml.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AMUCHINA S.r.l.

Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

PRODUTTORE

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Dicembre 2012

Agenzia Italiana del Farmaco

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INTEGRATI

PRIMA DELL'USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea Sodio ipoclorito

CHE COS'È

AMUKINE MED 0,05% Soluzione cutanea è un disinfettante per uso topico dermatologico.

PERCHÉ SI USA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si usa nei seguenti casi:

- disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.),
- disinfezione dei genitali esterni.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce l'attività dell'antisettico.

L'applicazione topica del prodotto può dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamento.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talora fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non pertinente

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Ripetere le applicazioni secondo necessità. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. Attenzione: non superare le dosi indicate.

Quando e per quanto tempo

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea è pronto all'uso. Applicare localmente mediante:

- lavaggio, bagno, irrigazione,
- compresse imbevute,
- bendaggi inumiditi.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI AMUKINE MED, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Amukine Med può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute: è possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Conservare il flacone in ambiente fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

Richiudere il flacone dopo ogni uso.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 ml contengono: principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g);
eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si presenta in forma di soluzione per uso esterno.

Il contenuto della confezione è di 250, 500 o 1000 ml.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AMUCHINA S.r.l.

Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

PRODUTTORE

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Dicembre 2012

Lotto n.: Scad.

MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE

Flacone 250 ml, AIC n. 032192015

Agenzia Italiana del Farmaco

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INTEGRATI

PRIMA DELL'USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea Sodio ipoclorito

CHE COS'È

AMUKINE MED 0,05% Soluzione cutanea è un disinfettante per uso topico dermatologico.

PERCHÉ SI USA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si usa nei seguenti casi:

- disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.),
- disinfezione dei genitali esterni.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce l'attività dell'antisettico.

L'applicazione topica del prodotto può dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamento.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talora fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non pertinente

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Ripetere le applicazioni secondo necessità. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. Attenzione: non superare le dosi indicate.

Quando e per quanto tempo

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea è pronto all'uso. Applicare localmente mediante:

- lavaggio, bagno, irrigazione,
- compresse imbevute,
- bendaggi inumiditi.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI AMUKINE MED, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Amukine Med può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute: è possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Conservare il flacone in ambiente fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

Richiudere il flacone dopo ogni uso.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 ml contengono: principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g);
eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si presenta in forma di soluzione per uso esterno.

Il contenuto della confezione è di 250, 500 o 1000 ml.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AMUCHINA S.r.l.

Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

PRODUTTORE

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Dicembre 2012

Lotto n.: Scad.

MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE

Flacone 500 ml, AIC n. 032192027

Agenzia Italiana del Farmaco

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INTEGRATI

PRIMA DELL'USO

LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta, ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea Sodio ipoclorito

CHE COS'È

AMUKINE MED 0,05% Soluzione cutanea è un disinfettante per uso topico dermatologico.

PERCHÉ SI USA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si usa nei seguenti casi:

- disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, ecc.),
- disinfezione dei genitali esterni.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al sodio ipoclorito o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è solo per uso esterno.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire un'adeguata terapia.

La presenza di materiali organici (proteine, siero, sangue, ecc.) riduce l'attività dell'antisettico.

L'applicazione topica del prodotto può dissolvere grumi di sangue e causare sanguinamento.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'ingestione o l'inalazione accidentale può avere conseguenze gravi, talora fatali. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non pertinente

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Ripetere le applicazioni secondo necessità. Non superare le 6 applicazioni quotidiane. Attenzione: non superare le dosi indicate.

Quando e per quanto tempo

Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Come

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea è pronto all'uso. Applicare localmente mediante:

- lavaggio, bagno, irrigazione,
- compresse imbevute,
- bendaggi inumiditi.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione accidentale avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI AMUKINE MED, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Amukine Med può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le soluzioni di ipoclorito possono essere irritanti per la cute: è possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione). Sono stati segnalati casi di dermatite allergica da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Conservare il flacone in ambiente fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

Richiudere il flacone dopo ogni uso.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 ml contengono: principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g);
eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

AMUKINE MED 0,05% soluzione cutanea si presenta in forma di soluzione per uso esterno.

Il contenuto della confezione è di 250, 500 o 1000 ml.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AMUCHINA S.r.l.

Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (Genova).

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

PRODUTTORE

A.C.R.A.F. S.p.A. Via Pontasso, 13 – 16015 Casella (Genova).

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Dicembre 2012

Lotto n.: Scad.

MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE

Flacone 1000 ml, AIC n. 032192039

Agenzia Italiana del Farmaco