

## **Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

### **Amuclor Med 2,5 g polvere per soluzione cutanea**

Cloramina T

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Amuclor Med e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Amuclor Med
3. Come usare Amuclor Med
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Amuclor Med
6. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

#### **1. Che cos'è Amuclor Med e a cosa serve**

Amuclor Med contiene cloramina T, un antisettico e disinfettante (che elimina i batteri) per uso locale. Amuclor Med è indicato per :

- disinfettare e pulire la pelle lesa (piccole ferite, abrasioni)
- disinfettare i genitali esterni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Amuclor Med**

##### **Non usi Amuclor Med**

- Se è allergico alla cloramina T

##### **Avvertenze e precauzioni**

- Il prodotto è solo per uso esterno.
- Il prodotto non diluito e' irritante per la pelle (specialmente se umida) e per gli occhi, e può risultare irritante per le vie respiratorie.
- Eviti il contatto con gli occhi, nel caso lavi gli occhi immediatamente con abbondante acqua e consulti un medico.
- Non applichi Amuclor Med su ferite estese.
- Non usi Amuclor Med per trattamenti prolungati. Se non ottiene risultati apprezzabili dopo un breve periodo di trattamento, consulti un medico.
- Eviti il contatto con gli acidi perché si sviluppano gas tossici di cloro.
- Eviti il contatto della soluzione poco diluita (contenuto della bustina sciolto in 250 ml di acqua) con i tessuti, in particolare lana e seta.

### **Altri medicinali e Amuclor Med**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Non sono noti effetti indesiderati se Amuclor Med viene utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Amuclor Med non altera la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. █

## **3. Come usare Amuclor Med**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Disinfezione e la pulizia della pelle lesa (ferite, abrasioni, piaghe): sciolga il contenuto di una bustina in 250 ml di acqua e tamponi la ferita con una garza sterile imbevuta della soluzione. Ripeta questa operazione, se necessario, 2-3 volte al giorno.

Disinfezione dei genitali esterni: sciolga il contenuto di una bustina in 1 litro di acqua e utilizzi la soluzione ottenuta per un accurato lavaggio delle parti intime esterne. Ripeta questa operazione, se necessario, 2 volte al giorno.

Usi questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento

Non superare le dosi consigliate. Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Se usa più Amuclor Med di quanto deve**

Alle normali condizioni d'uso non sono stati riportati danni causati da una dose eccessiva di questo medicinale.

L'ingestione o l'inalazione accidentale del prodotto può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione accidentale consulti immediatamente un medico o si rivolga al più vicino ospedale.

L'ingestione accidentale del prodotto può causare i seguenti sintomi proporzionali alla quantità di prodotto ingerita:

- irritazione e corrosione della mucosa dello stomaco e dell'intestino,
- vomito,
- colorazione bluastra della pelle (cianosi),
- abbassamento della pressione del sangue accompagnata da problemi al cuore (collasso circolatorio),
- bava alla bocca,
- insufficienza respiratoria che può portare a morte.

L'inalazione può causare:

- costrizione dei bronchi con difficoltà nel respiro (broncospasmo)

### **Se dimentica di usare Amuclor Med**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

## **Se interrompe il trattamento con Amuclor Med**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se durante il trattamento con Amuclor Med manifesta una reazione allergica (bolle, rossore, prurito) **INTERROMPA** immediatamente il trattamento e consulti il medico.

I seguenti effetti indesiderati sono stati segnalati con l'uso di Amuclor Med:

- **intolleranza** (bruciore o irritazione), generalmente priva di conseguenze, che non richiede una modifica del trattamento.

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Amuclor Med**

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo {SCAD}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Amuclor Med**

Una bustina da 2,5 g contiene:

Il principio attivo è Cloramina T (Tosilcloramide sodica) 2,5 g pari a 2.29 g di Tosilcloramide

### **Descrizione dell'aspetto di Amuclor Med e contenuto della confezione**

Amuclor Med si presenta in forma di polvere contenuta in bustine sigillate.

Ogni confezione contiene 12 bustine da 2.5 g ciascuna.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

AMUCHINA S.r.l.

Via Pontasso 13 – 16015 Casella (Genova)

### **CONCESSIONARIO PER LA VENDITA**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA

### **Produttori**

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22  
60131 Ancona.

FAMAR ITALIA S.p.A.  
Via Zambelletti, 25  
20021 Baranzate di Bollate (MI)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco