

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Ladip 4 mg compresse rivestite con film

Ladip 6 mg compresse rivestite con film

lacidipina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.

Contenuto di questo foglio:

- 1. Che cosa è Ladip e a che cosa serve**
- 2. Prima di prendere Ladip**
- 3. Come prendere Ladip**
- 4. Possibili effetti indesiderati**
- 5. Come conservare Ladip**
- 6. Altre informazioni**

1. Che cos'è Ladip e a che cosa serve

Ladip è usato per il trattamento della pressione alta del sangue (ipertensione). Appartiene ad una classe di medicinali chiamati "bloccanti dei canali del calcio". Ladip ha la proprietà di allargare (dilatare) i vasi sanguigni, facilitando il flusso sanguigno e abbassando la pressione.

2. Prima di prendere Ladip

Non prenda Ladip:

- se è **allergico** (ipersensibile) al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Ladip
- se lei è affetto da una malattia del cuore chiamata **stenosi aortica**. Questa malattia è un restringimento della valvola che permette al sangue di essere pompato fuori dal cuore
- ➔ se lei pensa che una di queste condizioni la riguardi, non prenda Ladip prima di averne parlato con il suo medico.

Faccia particolare attenzione con Ladip

Prima del trattamento con Ladip il suo medico deve sapere:

- se lei ha **problemi di cuore**
- se lei ha **malattie del fegato**

Assunzione di Ladip con altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Alcuni medicinali possono alterare l'attività di Ladip, o aumentarla provocando effetti collaterali. Ladip può anche alterare l'attività di altri medicinali, tra cui:

- altri medicinali utilizzati per il trattamento della **pressione alta del sangue** come furosemide, propranololo o captopril
- cimetidina (per il trattamento di **ulcere allo stomaco**)
- ciclosporina (usata per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organi o per alcune malattie autoimmuni).

L'uso concomitante di lacidipina e corticosteroidi o tetracosactide può diminuire l'effetto antiipertensivo.

→ **Parli con il medico o il farmacista** se sta prendendo uno di questi medicinali.

Assunzione di Ladip con cibi e bevande

Non beva succo di pompelmo mentre sta prendendo Ladip.

Gravidanza e allattamento

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non ci sono informazioni sulla sicurezza di impiego di Ladip in gravidanza. Se lei è **gravida o pensa di esserlo**, o se **sta pianificando una gravidanza non prenda Ladip** senza prima avere verificato con il suo medico. **Il suo medico** prenderà in considerazione rischi e benefici legati all'assunzione di Ladip per lei e per il suo bambino.

Il principio attivo e gli eccipienti di Ladip possono passare nel latte materno. **Se lei sta allattando, verifichi col suo medico** prima di iniziare la terapia con Ladip.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Ladip può causare vertigini. I pazienti dovrebbero essere allertati a non guidare o non usare macchinari se soggetti a vertigini o sintomi associati.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Ladip

- Ladip contiene lattosio: se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Ladip

Quanto prenderne

Prenda Ladip sempre seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. Verifichi con il suo medico o con il suo farmacista se non è sicuro.

La dose usuale di partenza di Ladip è di 2 mg una volta al giorno, la mattina.

Il suo medico può decidere se aumentare la dose a 4 o 6 mg, una volta al giorno la mattina dopo circa 3-4 settimane di terapia.

Come prenderlo

Deglutire la compressa con un po' di acqua.

È preferibile prendere la medicina ogni giorno alla stessa ora.

Può prendere Ladip con o senza cibo.

Se dimentica di prendere Ladip

Se dimentica di prendere una dose, prenda la successiva alla stessa ora. **Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.**

Se prende più Ladip di quanto deve

Se prende troppe compresse di Ladip è **molto probabile un abbassamento della pressione del sangue e un cambiamento del battito cardiaco, che può aumentare o diminuire.**

→ **Si rivolga al medico o al farmacista per un consiglio.**

Se interrompe il trattamento con Ladip

Prenda Ladip per il tempo raccomandato dal suo medico. Non interrompa l'assunzione di Ladip senza il consiglio del medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Ladip, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Ladip può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni

Possono riguardare **da 1 a 10 persone:**

- battiti irregolari del cuore (palpitazioni)
- battiti più veloci del cuore (tachicardia)
- gonfiore causato dai fluidi
- vertigini
- urinare di frequente
- cefalea
- rash cutanei (incluso arrossamento della pelle e prurito)
- vampate
- disturbi gastrici
- nausea
- stanchezza

Effetti indesiderati comuni che possono essere riscontrati con l'analisi del sangue:

- aumento reversibile del livello di un enzima chiamato fosfatasi alcalina

Effetti indesiderati non comuni

Questi possono riguardare **da 1 a 100 persone:**

- peggioramento del dolore toracico (peggioramento di preesistente angina pectoris)
- pallore
- abbassamento della pressione sanguigna
- emorragie, gengive dolenti
- sincope
- ipotensione

Effetti indesiderati rari

Questi possono riguardare **da 1 a 1.000 persone:**

- gravi reazioni allergiche con gonfiore del viso, lingua o gola che può causare difficoltà nella deglutizione o respirazione
- eritema pruriginoso nella pelle

Effetti indesiderati molto rari

Questi possono riguardare **da 1 a 10.000 persone**:

- agitazione o tremore delle braccia e delle gambe
- depressione

Se avete uno di questi effetti indesiderati

➔ Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati **peggiora**, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, **informi il medico o il farmacista**.

5. Come conservare Ladip

Tenere Ladip fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi Ladip dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

Conservi Ladip a temperatura non superiore a 30°C.

Conservare nel contenitore originale per proteggere dalla luce.

Non estrarre la compressa dal blister fino a quando non la deve prendere.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Altre informazioni

Cosa contiene Ladip

Il principio attivo è lacidipina. Ladip compresse è presente in diversi dosaggi.

Ogni compressa contiene:

4 mg di lacidipina

6 mg di lacidipina

Gli eccipienti sono:

lattosio, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E 171), polietilenglicole (PEG) 400, polisorbato 80.

Descrizione dell'aspetto di Ladip e contenuto della confezione

Ladip 4 mg compresse è di colore bianco, di forma rotonda con linea di frattura su un lato.

Confezione da 28 compresse.

Ladip 6 mg compresse è di colore bianco, di forma rotonda con linea di frattura su un lato.

Confezione da 14 compresse.

Ladip 6 mg compresse è di colore bianco, di forma rotonda con linea di frattura su un lato.

Confezione da 28 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Istituto Chimico Internazionale Giuseppe Rende S.r.l.

Via Salaria, 1240 – Roma (Italia)

Produttore

Special Product's Line S.P.A.

Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 – 03012 Anagni (FR) (Italia)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 06.2019

Agenzia Italiana del Farmaco