

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Gentalyn 0,1% crema gentamicina solfato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Gentalyn e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Gentalyn
3. Come usare Gentalyn
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gentalyn
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Gentalyn e a cosa serve

Gentalyn contiene il principio attivo gentamicina solfato, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antibiotici attivi contro molti microrganismi chiamati batteri (attività ad ampio spettro).

Gentalyn agisce a livello locale (topico), è efficace nelle infezioni della pelle ed è indicato:

- nelle forme infiammatorie della pelle, causate da batteri, come:
 - piddermiti, caratterizzate da infiammazioni della pelle di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, caratterizzato da bolle, [vescicole](#) e [pustole](#) che rompendosi danno luogo ad una lesione che guarisce con difficoltà;
 - follicoliti, infiammazioni della pelle in cui cresce il pelo;
 - sicosi, caratterizzate da infiammazioni delle parti coperte da peli;
 - foruncolosi;
 - eczemi microbici, caratterizzati da infiammazioni pruriginose della pelle causate da microbi.
- nelle forme infiammatorie in cui l'infezione batterica avviene in un secondo tempo rispetto al manifestarsi della malattia della pelle (infezioni secondarie) come:
 - dermatiti, caratterizzate da infiammazioni della pelle;
 - eczemi impetiginizzati, caratterizzate da lesioni vescicolo-pustolose;
 - ulcere da stasi, lesioni della pelle di difficile guarigione causata dalla circolazione del sangue compromessa;

- lesioni traumatiche;
- bruciature (ustioni) di vario grado ed estensione nelle quali sulla cute ustionata può essere facilitato lo sviluppo di batteri particolarmente aggressivi;
- escoriazioni infette.
- nelle altre infezioni della pelle come:
 - acne;
 - psoriasi pustolosa, caratterizzata da infiammazione della pelle non contagiosa con formazione di piccole bolle gialle piene di siero;
 - forme intertriginoidi caratterizzate da arrossamento, desquamazione, irritazione e prurito dovuti allo sfregamento di due parti vicine del corpo;
 - perionissi, infiammazioni del bordo della pelle vicino all'unghia di origine batterica.

Gentalyn è particolarmente indicato nelle forme comparse da breve tempo (acute) accompagnate dalla presenza di liquido infiammatorio (in fase essudativa).

Nelle malattie della pelle causate da funghi, Gentalyn per uso locale (topico) non è efficace, poiché la gentamicina non è attiva su alcun tipo di fungo. Il medicinale può essere utilizzato nelle infezioni da batteri che si sviluppano dove esistono già infezioni da funghi e da altri microrganismi denominati virus (superinfezioni batteriche).

2. Cosa deve sapere prima di usare Gentalyn

Non usi Gentalyn

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gentalyn.

Non utilizzi questo medicinale sugli occhi.

Interrompa il trattamento ed informi il medico se manifesta un'irritazione o una reazione allergica (sensibilizzazione) a seguito dell'uso di questo medicinale, soprattutto per periodi prolungati.

Può verificarsi, a seguito dell'uso prolungato ed eccessivo della gentamicina, così come di altri antibiotici, che si sviluppino microrganismi resistenti, in tal caso il medico le indicherà di sospendere il trattamento e le prescriverà una terapia idonea.

Usi il medicinale con cautela ed informi il medico se è allergico ad altri antibiotici del gruppo degli aminoglicosidi, perchè può manifestarsi una reazione allergica (ipersensibilità crociata);

-

Eviti l'uso contemporaneo e/o sequenziale di altri farmaci che causano tossicità ai reni (nefrotossici) e/o al cervello (neurotossici) per via sistemica o topica.

L'assorbimento sistemico (a livello circolatorio) di gentamicina topica aumenta se vengono trattate aree del corpo estese, specialmente in presenza di danni alla pelle o in caso di trattamenti di lunga durata. In questo caso possono manifestarsi effetti indesiderati che si evidenziano con l'uso sistemico di gentamicina. Tenga presente questo soprattutto nel caso di trattamento di lattanti o bambini.

-

Gentalyn non è attivo nelle infezioni della pelle provocate da virus e funghi.

Bambini

Nella primissima infanzia il medicinale va somministrato solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Altri medicinali e Gentalyn

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Al momento non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza, utilizzi questo medicinale soltanto in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Gentalyn non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Gentalyn contiene clorocresolo che può causare reazioni allergiche e **alcol cetostearilico** che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

3. Come usare Gentalyn

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi il medicinale 3-4 volte al giorno fino a che non si nota un miglioramento, dopodiché può ridurre il numero delle applicazioni ad 1-2 nelle 24 ore.

Dopo l'applicazione, protegga la parte con garza sterile.

Se usa più Gentalyn di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di **Gentalyn** avverta immediatamente il medico o si rivolga al Pronto Soccorso del più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Gentalyn

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Gentalyn

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

- reazioni allergiche da contatto;
- irritazione temporanea della pelle come eritema o prurito che di solito non richiede l'interruzione della terapia.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Gentalyn

Dopo prima apertura, il medicinale ha una validità di 3 mesi.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Gentalyn

- Il principio attivo è gentamicina solfato. 100 g di crema contengono 0,166 g di gentamicina solfato.
- Gli altri componenti sono clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere (cetomacrogol 1000), alcol cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato monobasico, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Gentilyn e contenuto della confezione

Gentilyn 0,1% crema - tubo da 30 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
MSD Italia S.r.l., Via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma

Concessionaria di vendita
Essex Italia S.r.l., Via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma

Produttore
Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-Op-Den-Berg, Belgio.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il.

Agenzia Italiana del Farmaco