Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Voltatrauma 2% + 1% gel
oxerutina/sodio-calcio-metilgalattopolisolfato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Voltatrauma e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Voltatrauma
3. Come usare Voltatrauma
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Voltatrauma
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Voltatrauma e a cosa serve

Voltatrauma contiene due principi attivi:
- l'oxerutina, una sostanza che protegge i capillari riducendone la fragilità e normalizzandone la permeabilità (il passaggio dei liquidi attraverso le pareti dei vasi)
- il sodio-calcio-metilgalattopolisolfato, un derivato eparinoide che riduce la coagulazione del sangue e ne scioglie i coaguli.

Voltatrauma è indicato per il trattamento di traumi minori.

Interrompa il trattamento con Voltatrauma e si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Voltatrauma

Non usi Voltatrauma
- se è allergico all'oxerutina o al sodio-calcio-metilgalattopolisolfato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Voltatrauma.
Interrompa il trattamento con Voltatrauma e si rivolga al medico che le darà un adeguato trattamento, se si presentano delle irritazioni alla pelle o reazioni allergiche, soprattutto con l'uso prolungato.
- Usi Voltatrauma sulla pelle intatta, non lo usi su ferite aperte.
- Applichi il medicinale su aree limitate della pelle.

Altri medicinali e Voltatrauma

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono noti medicinali che possano modificare l'effetto di Voltatrauma.

Voltatrauma con cibi, bevande e alcol
Non sono noti alimenti che possano modificare l'effetto di Voltatrauma.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza
La sicurezza del medicinale in gravidanza non è stata determinata, pertanto non usi Voltatrauma durante la gravidanza.

Allattamento
Non ci sono controindicazioni all'uso di Voltatrauma durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Voltatrauma non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Voltatrauma contiene metil-p-idrossibenzoato
Voltatrauma contiene metil-p-idrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare Voltatrauma

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi Voltatrauma 2-3 volte al giorno sulla superficie di pelle da trattare, frizionando leggermente fino a completo assorbimento.
Su zone particolarmente doloranti, può applicare Voltatrauma con una garza che può fissare con una benda.
In questi casi può applicare il gel con un delicato massaggio sulle zone che stanno intorno.
Non superi le dosi raccomandate senza il consiglio del medico.
Usi Voltatrauma solo per brevi periodi di trattamento.
Si rivolga al medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se usa più Voltatrauma di quanto deve
Non sono noti casi di sovradosaggio con Voltatrauma.
In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Voltatrauma, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Voltatrauma
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Voltatrauma
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Sono stati descritti rari casi di reazioni allergiche con effetti sulla pelle.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Tuttavia se si presentano, si rivolga al medico o al farmacista.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Voltatrauma

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scadenza.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Voltatrauma

- I principi attivi sono l'oxerutina e il sodio-calcio metilgalattopolisolfato. 100 g di gel contengono 2 g di oxerutina e 1 g di sodio-calcio metilgalattopolisolfato.
- Gli altri componenti sono: **metil-p-idrossibenzoato**, acido acrilico polimerizzato, sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Voltatrauma e contenuto della confezione

Voltatrauma si presenta in forma di gel per uso cutaneo, confezionato in tubo.
Il contenuto della confezione è di 40 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A Via Zambeletti snc, 20021- Baranzate-Milano

Produttore
Novartis Farma S.p.A.
Via Provinciale Schito n. 131
Torre Annunziata (NA)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 25/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).