

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### MIGXIA 10mg/g crema Perossido di idrogeno

#### **Legga attentamente questo foglio poichè contiene importanti informazioni per lei.**

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia, deve usare MIGXIA 10mg/g crema in modo accurato per ottenerne i migliori risultati.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se i suoi sintomi peggiorano o non migliorano dopo tre settimane, deve contattare il medico.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MIGXIA 10mg/g crema e a che cosa serve
2. Prima di prendere MIGXIA 10mg/g crema
3. Come prendere MIGXIA 10mg/g crema
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MIGXIA 10mg/g crema
6. Altre informazioni

### **1. CHE COS'È MIGXIA 10mg/g crema E A CHE COSA SERVE**

Questo medicinale contiene il principio attivo perossido di idrogeno che appartiene al gruppo di medicinali denominati antisettici e disinfettanti.

La crema è utilizzata per il trattamento delle infezioni minori della pelle causate da germi che sono noti per essere sensibili al perossido di idrogeno.

### **2. PRIMA DI UTILIZZARE MIGXIA 10mg/g crema**

#### **Non usi MIGXIA 10mg/g crema**

- se è allergico (ipersensibile) al perossido di idrogeno.
- se è allergico ad uno qualsiasi degli eccipienti di MIGXIA 10mg/g crema (che sono elencati nel paragrafo 6, Altre Informazioni).

#### **Faccia particolare attenzione con MIGXIA 10mg/g crema**

Faccia attenzione ad evitare il contatto con gli occhi. Se MIGXIA 10mg/g crema accidentalmente entra in contatto con gli occhi, li lavi immediatamente con abbondante acqua.

Non utilizzi la crema su ferite grandi o profonde, o sulla pelle sana.

Il perossido di idrogeno può sbiancare i tessuti e la zona della pelle sede dell'applicazione.

#### **Uso di MIGXIA 10mg/g crema con altri medicinali**

MIGXIA 10mg/g crema non deve essere usato in presenza di iodio, permanganati o altri forti agenti ossidanti (utilizzati nei disinfettanti).

MIGXIA 10mg/g crema non deve essere usato con prodotti che contengono papaina perchè può diminuirne la loro efficacia.

#### **Gravidanza e allattamento**

Informi il medico se aspetta un bambino, se pensa di aspettare un bambino o se sta allattando.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti di MIGXIA 10mg/g crema**

- L'acido salicilico è un lieve irritante e può causare dermatite (arrossamento, prurito della pelle con vesciche o croste).
- Il glicole propilenico può causare irritazione della pelle.

### **3. COME USARE MIGXIA 10mg/g crema**

Segua esattamente le istruzioni del medico o farmacista. Controlli sempre l'etichetta per vedere come utilizzare questo medicinale. Se ha dubbi deve consultare il farmacista.

*Adulti, anziani e bambini (età maggiore di 3 anni)*

MIGXIA 10mg/g crema deve essere applicata 2-3 volte al giorno sulla parte infetta. In seguito all'applicazione apparirà sulla pelle una pellicola secca che può essere lavata via con acqua.

Non usare in maniera continuativa per più di 3 settimane.

**Se dimentica di applicare una dose**, la applichi appena se ne ricorda e poi continui come in precedenza.

### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, MIGXIA 10mg/g crema può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestano.

**Effetti indesiderati molto rari** (che colpiscono probabilmente meno di 1 su 10.000 pazienti che usano questo medicinale):

Dolore e sensazione di bruciore della ferita, prurito, dermatite ed eczema, eritema, edema, irritazione, infiammazione, infezione, erisipela, tromboflebite.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, **informi il medico o il farmacista**.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. COME CONSERVARE MIGXIA 10mg/g crema**

#### **Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**

Conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Tenere il tubo ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non usi MIGXIA 10mg/g crema dopo la data di scadenza che è riportata sul tubo e sulla scatola dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Il periodo di validità dopo prima apertura è di 28 giorni. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. ALTRE INFORMAZIONI**

**Cosa contiene MIGXIA 10mg/g crema**

- Il principio attivo è perossido di idrogeno 10mg/g (1 grammo di crema contiene 10 mg di perossido di idrogeno).
- Gli eccipienti sono Gliceril monolaurato, Gliceril monomiristato, Poliossietilene (100) stearato, Glicole propilenico, Acido citrico anidro, Idrossido di sodio, Acido solforico 1M, Ossalato di sodio, Acido salicilico, Edetato disodico, Pirofosfato di sodio, Stannato di sodio, Acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di MIGXIA 10mg/g crema e contenuto della confezione**

MIGXIA 10mg/g crema è una crema omogenea, bianca perlacea in un tubo di polietilene. Ogni tubo è contenuto in una scatola di cartone, in formati da 10 grammi e 25 grammi. E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Sandoz S.p.A.  
Largo U. Boccioni, 1  
21040 Origgio (VA)

**Produttore**

Bioglan AB  
P.O. Box 50310,  
S-202 13 Borrgatan 31  
Malmö, Svezia

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

Italia: MIGXIA 10mg/g crema  
Spagna: MIGXIA 10mg/g crema

**Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il ...**