

VEREL collodio soluzione cutanea

Categoria farmacoterapeutica

Preparato per il trattamento delle varie forme di verruche.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento delle varie forme di verruche (verruche volgari, verruche plantari, verruche a mosaico). Può essere usato per ridurre le dimensioni delle verruche in preparazione ad interventi terapeutici di tipo fisico. L'uso del prodotto è consigliato anche per asportare calli e duri.

Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Precauzioni per l'uso

VEREL va applicato solo sulla zona interessata (verruche o calli), evitando che venga a contatto con la cute sana. VEREL non va applicato su verruche seborroiche né su verruche del viso o anogenitali (condilomi) né su nevi. Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

Interazioni con altri farmaci o di altro genere

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.

Avvertenze speciali

VEREL è molto infiammabile e il flaconcino deve essere richiuso accuratamente dopo l'uso con la propria capsula per evitare la fuoriuscita del prodotto. Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare il contatto con gli occhi.

Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Verel non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

Dose, modo e tempo di somministrazione

Alla sera mettere a bagno in acqua calda per 5 minuti la zona cutanea interessata. Quindi, dopo aver asciugato accuratamente, stendere sulla verruca o sul callo uno strato sottile del prodotto servendosi del pennellino contenuto nella confezione.

Il prodotto essiccandosi all'aria formerà una sottile pellicola protettiva, insolubile in acqua. Non è necessario proteggere la parte con garza. Al mattino, riapplicare il prodotto con le stesse modalità dopo aver rimosso la pellicola di VEREL. Due o tre volte la settimana, dopo aver lavato con acqua calda ed asciugato bene la parte, strofinare con una spugnetta o una limetta abrasiva in maniera da facilitare la rimozione della verruca o del callo; quindi riapplicare il prodotto.

NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

EFFETTI INDESIDERATI

Sono stati segnalati arrossamenti della cute circostante la verruca accompagnati da lieve sensazione di bruciore.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione;

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;

Conservare il medicinale a temperatura non superiore a 25°C.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Tenere il medicinale fuori dalla vista e della portata dei bambini.

Composizione

100 g contengono:

principi attivi: acido salicilico 11 g, acido lattico 4 g, rame acetato 0,004 g; eccipienti: etanolo (96°) 0,75 g, collodio (6%) 76,25 g, colofonia 2 g, oleoresina di larice 6 g.

Forma farmaceutica e contenuto

Collodio, soluzione cutanea - Flacone da 10 ml

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Astellas Pharma S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato,6 – U7(Piano IV) – 20090 Assago (Milano)

Produttore

Zeta Farmaceutici S.p.A. – Via Galvani 10 – 36066 Sandrigo (Vicenza)

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: