

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

OMATROPINA LUX 1% collirio, soluzione

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è OMATROPINA LUX e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare OMATROPINA LUX
3. Come usare OMATROPINA LUX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare OMATROPINA LUX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è OMATROPINA LUX e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo omatropina bromidrato, che appartiene ad una categoria di medicinali chiamati anticolinergici.

Omatropina Lux è indicato:

- per effettuare esami agli occhi,
- nell'esame della funzionalità visiva dell'occhio,
- nella terapia dello strabismo per la rieducazione dell'occhio pigro,
- nelle forme iniziali di opacità centrale del cristallino dell'occhio (cataratta centrale o nucleare),
- nei casi di ridotta capacità visiva durante le ore notturne,
- per ridurre l'attività di messa a fuoco (accomodativa) nella miopia dell'infanzia e scolare.

2. Cosa deve sapere prima di usare OMATROPINA LUX

Non usi OMATROPINA LUX

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è affetto da glaucoma o possiede una tendenza alla pressione elevata all'interno dell'occhio.
- Nei bambini al di sotto dei tre anni di età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare OMATROPINA LUX.

Usi con cautela:

- se ha la pressione alta,
- se ha un'umentata attività della tiroide,
- se ha il diabete.

Questo medicinale è solo per uso oculare.

OMATROPINA LUX può provocare un aumento della pressione dell'occhio.

Eviti l'uso del medicinale in caso di cute o mucose infiammate o danneggiate.

L'uso in occhi predisposti, specie in soggetti in età avanzata, può determinare l'aumento della pressione sanguigna o un attacco di glaucoma.

Bambini

Da non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età.

Altri medicinali e OMATROPINA LUX

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto, o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico se sta assumendo medicinali colino-mimetici (tra cui inibitori dell'acetilcolinesterasi), che agiscono mimando l'azione dell'acetilcolina, una sostanza prodotta dall'organismo.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non guidi veicoli né utilizzi macchinari in quanto questo medicinale può modificare la sua capacità visiva.

3. Come usare OMATROPINA LUX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-3 gocce da instillare nell'occhio ogni 6-8 ore, secondo prescrizione medica.

Dopo l'applicazione deve premere per un minuto con un dito sugli angoli degli occhi vicino al naso per chiudere i punti lacrimali.

Uso nei bambini

Per la riduzione dell'attività accomodativa (di messa a fuoco) nella miopia dell'infanzia e scolare: 1 o 2 instillazioni alla settimana.

Se usa più OMATROPINA LUX di quanto deve

Informi immediatamente il medico in caso di ingestione accidentale o di sovradosaggio. Il medico le somministrerà il trattamento adeguato.

Se dimentica di usare OMATROPINA LUX

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza di una dose.

Istruzioni per l'apertura del flacone


Il flacone del collirio è provvisto di tappo di sicurezza per prevenire l'apertura accidentale da parte dei bambini.

Per aprire, premere il tappo verso il basso e contemporaneamente svitare.

Per chiudere, riavvitare il tappo a fondo.

Tappo di sicurezza


Per aprire



1. premere verso il basso



2. contemporaneamente svitare



3. riavvitare a fondo

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

La perdita del potere di accomodazione (di messa a fuoco) è una conseguenza del tutto normale dell'azione dell'omatropina

L'uso prolungato può provocare fenomeni locali irritativi caratterizzati da:

- congestione dell'occhio (aumentato afflusso di sangue),
- edema (accumulo di liquidi),
- eczema (reazione infiammatoria della pelle con prurito)
- congiuntivite follicolare (infiammazione della congiuntiva con presenza di follicoli).

L'impiego continuo o troppo frequente può determinare, specialmente nei bambini:

- diarrea,
- secchezza della bocca,
- disturbi della visione.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare OMATROPINA LUX

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Validità dopo prima apertura: 28 giorni.

Il flacone è chiuso correttamente (a prova di bambino) se, svitando il tappo senza premere, si sente uno scatto.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene OMATROPINA LUX

- Il principio attivo è omatropina bromidrato.
- Gli altri componenti sono borace, acido borico, potassio cloruro, clorobutanolo, alcool, mentolo, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di OMATROPINA LUX e contenuto della confezione

Collirio, soluzione

1 flacone in plastica da 9 ml

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Bausch & Lomb - IOM S.p.A.

Via Pasubio, 34

20846 Macherio (MB)

Produttore:

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica 20/22

00040 Pomezia (Roma)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Altre fonti di informazioni

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia Italiana del Farmaco: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/>