FOGLIO ILLUSTRATIVO

DISEBRIN 5% collirio, soluzione
Eparina sodica

1 flacone da 3 ml

Medicinale equivalente

COMPOSIZIONE
Principio attivo: eparina U.I. 650.000

Eccipienti: borace, acido borico, alcool benzilico, acqua depurata.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Collirio, soluzione. Flacone da 3 ml

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Altri oftalmologici

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bausch & Lomb - IOM S.p.A.
Via Pasubio, 34
20846 Macherio (MB)

PRODUTTORE
Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica 20/22
00040 Pomezia (Roma)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Nel trattamento di ustioni caustiche e termiche della congiuntiva, di congiuntivite lignea e di alcuni casi di cheratoipopion.
Il Disebrin collirio, inoltre, è indicato nelle dislacrimie ed in particolare nella cheratocongiuntivite secca.

CONTROINDICAZIONI
L'uso è controindicato nei pazienti che presentano fenomeni di sensibilizzazione verso qualunque dei componenti la specialità.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO
Usare il collirio esclusivamente per uso esterno, evitando l'applicazione quando la cute o le mucose siano infiammate o comunque lese.
Nel caso di ustioni chimiche, è bene far precedere alla prima applicazione un accurato lavaggio o la completa neutralizzazione dell'agente ustionante.
Impiego in gravidanza ed allattamento
Non sono noti effetti teratogenetici ed embriotossici dell'eparina usata per via topica. Non deve essere impiegato nei bambini sotto i tre anni di età.

INTERAZIONI
Nessuna in particolare.

Documento reso disponibile da AIFA il 29/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

AVVERTENZE SPECIALI
Il Disebrin non modifica lo stato di vigilanza e può quindi essere somministrato anche in pazienti che debbano porsi alla guida di autoveicoli.
Il prodotto, se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici. Esso va tenuto quindi lontano dalla portata dei bambini.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Nei primi due giorni instillare 1 goccia di collirio ogni ora, secondo prescrizione medica.
Nei giorni seguenti effettuare l'applicazione con maggiore intervallo di tempo.
Nelle dislacrimie somministrare 1 o 2 gocce di collirio 4 volte al giorno.

EFFETTI INDESIDERATI
Nel caso in cui dovessero manifestarsi fenomeni di sensibilizzazione è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea.
In caso di eventuali effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo, darne comunicazione al proprio medico o farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Validità dopo prima apertura: 28 giorni

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

Data ultima revisione: Giugno 2010

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 29/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).