



PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO
ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CLOREXIDINA SANITAS

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono: Principio attivo: Clorexidina digluconato 5 g, pari a 2,8 g di sostanza base per un totale di 50 g di clorexidina digluconato per un flacone da 1.000 ml. Eccipienti: Nonoxinolo, Alcool etilico 95°, Colore E 122, Acqua deionizzata.

COME SI PRESENTA

Clorexidina Sanitas si presenta in forma di concentrato per soluzione cutanea. Il contenuto della confezione è di 1.000 ml.

CHE COS'E'

Disinfettante per uso cutaneo.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

SANITAS S.r.l., Via Guala, 4 - 15057 Tortona (AL)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

- 1) Esoform srl - viale del Lavoro 10 - 45100 Rovigo
- 2) Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovía de Logroño - Utebo - Zaragoza (Spagna)

PERCHE' SI USA

Clorexidina Sanitas si usa per: disinfezione e pulizia della cute anche lesa (ferite, abrasioni, escoriazioni); preparazione del campo operatorio e antisepsi delle mani; disinfezione di strumenti sanitari.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico in particolare verso perossido di idrogeno, saponi ioduri, tensioattivi anionici.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie prolungato, di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

Evitare l'uso contemporaneo con altri antisettici e detergenti.



E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Non usare per trattamenti prolungati. Dopo brevi periodi di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione e l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, a volte fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico e praticare una lavanda gastrica con latte, albume d'uovo, gelatina, sapone neutro. Evitare il contatto con gli occhi, cervello, meningi e orecchio medio. Non usare per la disinfezione di mucose.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Diluire due tappi in un litro di acqua sterile; applicare mediante cotone, garze o impacchi fino a due volte al giorno. Il tempo di contatto non deve essere inferiore a due minuti, non superare la dose consigliata.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

Se non si superano le dosi consigliate non esiste rischio di sovradosaggio. In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Clorexidina Sanitas, avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale. Vedere anche capitolo relativo a "È importante sapere che".

EFFETTI INDESIDERATI

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifiche di trattamento. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista. E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate la confezione riportante il foglio illustrativo. Conservare il recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

Aprile 2002

Flacone da 1000 ml

A.I.C. 033757016

Lotto N.

Scadenza

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Prezzo di vendita €

**Titolare A.I.C.: SANITAS S.r.l. – Via Guala, 4 – 15057 Tortona (AL)
MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE**